

Estado del Conocimiento
de la Fauna Silvestre
en la jurisdicción de Corantioquia



CORANTIOQUIA

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Estado del conocimiento de la fauna silvestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA / Juan Camilo Restrepo Llano, John Jairo Restrepo Salazar, Jhon Alexander Isaza Agudelo, Ana Maria Arango Pérez, Juliana Hurtado Hernández. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. Medellín: CORANTIOQUIA, 2010. 176 p. il. fotos a color

ISBN: 978-958-99363-0-6

Palabras claves:

1. Fauna Silvestre. 2. Antioquia. 3. Corantioquia. 4. Memoria Institucional. 5. Mamíferos. 6. Aves. 7. Reptiles. 8. Anfibios. 9. Inventarios.

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia

Director General

Luis Alfonso Escobar Trujillo

Subdirectora de Ecosistemas

Gloria Amparo Alzate Agudelo

Textos

Juan Camilo Restrepo Llano

John Jairo Restrepo Salazar

Jhon Alexander Isaza Agudelo

Ana Maria Arango Pérez

Juliana Hurtado Hernández

Edición

Oficina Asesora de Comunicaciones

Diseño y Diagramación

Marta Salazar Jaramillo

Diana Ochoa Yepes

Isaías González Valencia

Impresión

Impresos Begón

Fotografías

Corantioquia

Carátula: Fundación Proaves

Primera Edición

Medellín, Enero de 2010.

Distribución gratuita

Permitida la reproducción parcial o total de esta publicación con fines pedagógicos, citando las respectivas fuentes.

Publicación elaborada en papel ecológico que en su fabricación ha tomado en cuenta medidas concretas para evitar impactos ambientales sobre el patrimonio natural.



Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	9
1. INTRODUCCIÓN	13
2. CORANTIOQUIA Y SU JURISDICCIÓN	19
3. ESTADO CONOCIMIENTO	25
4. DIVERSIDAD DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE EN LA JURISDICCIÓN	35
4.1. Diversidad de aves	37
4.2. Diversidad de mamíferos no voladores	39
4.3. Diversidad de mamíferos voladores	41
4.4. Diversidad de anfibios y reptiles	42
5. GESTIÓN DE CORANTIOQUIA PARA EL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	45
5.1. Generación de conocimiento	47
5.2. Control al tráfico ilegal	49
5.3. Tratamiento y manejo de especies post decomiso	50
5.4. Actividades de sensibilización y de capacitación	53
6. ALGUNAS ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y/O ECONÓMICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA	55
6.1. Oso andino (<i>Tremarctos ornatus</i>)	57
6.2. Jaguar (<i>Panthera onca</i>)	60
6.3. Danta común (<i>Tapirus terrestris colombianus</i>)	62
6.4. Manatí (<i>Trichechus manatus</i>)	64
6.5. Nutria (<i>Lontra longicaudis</i>)	66
6.6. Chigüiro (<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>)	68
6.7. Mono aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>)	70
6.8. Perezoso de tres dedos (<i>Bradypus variegatus</i>)	72
6.9. Tití gris (<i>Saguinus leucopus</i>)	74
6.10. Paujil de pico azul (<i>Crax Albergi</i>)	76
6.11. Guacamaya verde (<i>Ara militaris</i>)	78
6.12. Gallito de roca (<i>Rupicola peruviana</i>)	80
6.13. Arriero antioqueño (<i>Lipaugus weberi</i>)	82
6.14. Perezoso de dos dedos (<i>Choloepus hoffmanni</i>)	84
6.15. Loro Orejiamarillo (<i>Ognorhynchus icterotis</i>)	86
ANEXOS	89
BIBLIOGRAFÍA	172

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	Municipios jurisdicción Corantioquia
Tabla 2	Número de especies de AVES por Dirección Territorial.
Tabla 3	Número de especies de MAMIFEROS NO VOLADORES por Dirección Territorial.
Tabla 4	Número de especies de MAMIFEROS VOLADORES por Dirección Territorial.
Tabla 5	Número de especies de ANFIBIOS y REPTILES por Dirección Territorial.
Tabla 6	Número de especies endémicas de anfibios y reptiles reportados en cada Dirección Territorial.
Tabla 7	Categoría y número de estudios sobre la fauna silvestre realizadas por CORANTIOQUIA 1995–2009.
Tabla 8	Resumen de animales recibidos por CORANTIOQUIA entre los años 1995 y 2009.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Mapa jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Figura 2	Porcentaje de estudios por grupo faunístico.
Figura 3	Porcentaje de estudios por objeto de estudio.
Figura 4	Metodologías más utilizadas en los estudios de fauna.
Figura 5	Estudios de fauna silvestre realizados a lo largo del tiempo.
Figura 6	Número de estudios realizados por tipo de publicación.
Figura 7	Porcentaje de estudios por Dirección Territorial.
Figura 8	Número de estudios para cada grupo faunístico realizados por Dirección Territorial.

LISTA DE ANEXOS

- | | |
|---------|--|
| Anexo 1 | Algunos estudios e inventarios realizados con el apoyo de Corantioquia, relacionados con el componente de fauna silvestre. |
| Anexo 2 | Listado oficial de aves presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. |
| Anexo 3 | Listado oficial de Mamíferos no Voladores presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA. |
| Anexo 4 | Listado Oficial de Mamíferos Voladores presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. |
| Anexo 5 | Listado oficial de anfibios presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. |
| Anexo 6 | Listado oficial de reptiles presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. |

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia



PRESENTACIÓN

Por sus condiciones biogeográficas el territorio colombiano es rico en biodiversidad; la jurisdicción de Corantioquia que integra 80 municipios del departamento de Antioquia, posee una parte significativa de esta riqueza, gracias a su complejidad geográfica y climática que hacen posible la presencia de una amplia gama de hábitat en biomas que van desde la selvas húmedas tropicales hasta los bosques alto andinos y páramos.

Así, como se ha demostrado a través de un gran número de estudios, tenemos en nuestro territorio una importante diversidad de especies de flora y fauna silvestre, que si bien su número real todavía está por definirse, los análisis realizados, nos llevan a determinar que es comparativamente alto, teniendo en cuenta la información de otras regiones y las condiciones antes mencionadas.

Con respecto a la fauna silvestre, de manera sistemática tenemos conocimiento de la presencia en nuestro territorio de 117 especies de anfibios, 107 de reptiles, 114 de mamíferos no voladores, 128 de murciélagos y 797 de aves; información que ha sido validada por los expertos de cada una de las clases taxonómicas.

Desde este componente vital de la biodiversidad hemos considerado que la educación es una de las principales estrategias para evitar su deterioro y exterminio, por eso le hemos apostado a la formación de públicos, para lo cual venimos trabajando de la mano de los habitantes de la jurisdicción, al igual que en coordinación con otras entidades del departamento, agrupadas en el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia –CIFFA-, con el propósito de lograr el respeto por la fauna silvestre y demás seres vivos.

La responsabilidad que tenemos como Corporación Autónoma Regional de preservar y conservar el patrimonio natural de nuestra región, es un asunto que compartimos con la sociedad en pleno; los seres humanos hemos establecido una relación permanente con los animales, son parte del entorno y de la cotidianidad, sin embargo, algunas especies de fauna silvestre han desaparecido y otras tienen una fuerte presión, lo que amenaza también su existencia sobre el planeta.

Esta publicación es el esfuerzo de investigadores, académicos, técnicos y funcionarios, que han estudiado y recorrido la jurisdicción de Corantioquia; la información y

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

los análisis que hoy entregamos, estamos seguros motivarán la generación de nuevo conocimiento por parte de ustedes, esperamos que estas nuevas iniciativas planteen propuestas que conlleven a la conservación de este componente de la biodiversidad.

LUIS ALFONSO ESCOBAR TRUJILLO
Director General



AGRADECIMIENTOS

Una publicación de esta dimensión es imposible de llevarse a cabo sin el concurso de gran cantidad de personas: investigadores, compiladores temáticos, diseñadores, correctores de texto, entre otros.

A cada una de las personas cuyos nombres aparecen en el texto y aquellos cuya dedicación no ha sido documentada como el caso de los trocheros, guías y otras personas que aportaron su conocimiento a la generación de esta publicación.

Queremos también resaltar y agradecer el esfuerzo de las personas allegadas a cada uno de los investigadores que están reflejados en este compendio. En especial a su núcleo familiar cercano, porque han tenido que acondicionar en muchos casos sus dinámicas cotidianas a las necesidades que conlleva la generación de conocimiento.

A la vida y sus múltiples manifestaciones y a aquellos animales que han sido sacrificados en las investigaciones académicas en aras de aportar al conocimiento.





Introducción

Las manifestaciones de la vida están más allá de lo que podemos reportar en nuestras predeterminaciones y esquemas, ellas están impresas de múltiples maneras en cada una de las oportunidades de la existencia.

1. INTRODUCCIÓN

La existencia del ser humano siempre ha estado relacionada a la de los animales, ellos son parte de el entorno, han constituido una fuente primaria para satisfacer algunas de nuestras necesidades: cuero, carne, leche, medicinas, fuerza, compañía, entre otros productos y servicios que nos proporcionan desde tiempos inmemorables.

Algunas especies animales han sido objeto de una sistemática manipulación genética dados sus atributos productivos especiales, haciendo que aparezcan las especies domesticas, altamente conocidas por todos con su variedad de razas que colman los intereses de una sociedad cada vez más exigente. Sin embargo existen en nuestro alrededor inclusive conviviendo en nuestro entorno cercano una diversidad de animales cuya base genética nunca ha sido alterada, estos son denominados animales silvestres.

La gran diversidad de ecosistemas del territorio colombiano, ha resultado de los diferentes espacios geográficos, gracias a la ubicación latitudinal intertropical y la variedad de condiciones edafoclimáticas que lo caracterizan, conduciendo a la megadiversidad biológica de especies de vida silvestre (Chávez & Arango, 1997).

De esta manera, Colombia es uno de los países neotropicales con mayor número de especies de vertebrados en el ámbito global, ocupando el primer lugar en número de especies de anfibios (Acosta, 2000) y aves; el tercer lugar en número de especies de reptiles y murciélagos y el cuarto en mamíferos no voladores.

Por su parte, Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con mayor diversidad de fauna silvestre, esto es favorecido por el variado mosaico de hábitat en diferentes ecosistemas y regiones biogeográficas con las que cuenta, tales como las cordilleras Central y Occidental, los valles interandinos del Cauca, Magdalena y Porce-Nechí, el valle del Atrato y la región costera del Caribe. Además, Antioquia es el único departamento Colombiano que posee cinco áreas de endemismo para las Aves dentro de su territorio. Al igual, también presenta una importante concentración de especies con rangos restringidos y/o con algún grado de amenaza.

La jurisdicción de Corantioquia comprende una extensión de 36.059 km², correspon-

dientes a 80 municipios (66%) del departamento de Antioquia, con 3´200.000 habitantes (65% de la población). Este extenso territorio posee heterogeneidad de paisajes y regiones geográficas. Está constituido por la Cordillera Central en su extremo norte, la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, los valles interandinos de los ríos Cauca, Magdalena y Porce-Nechí, y la vertiente occidental de la Serranía de San Lucas, lugar en donde se origina un amplio mosaico de regiones geográficas, hábitat y ecosistemas (Toro y Cuervo, 2001). Lo que convierte a la jurisdicción en poseedora de una gran riqueza de especies de flora y fauna, infortunadamente algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción, debido a la destrucción de los ecosistemas naturales y al uso desmedido por parte del hombre.

Los procesos de conservación requieren un marco conceptual para actuar y uno de los elementos más importantes es conocer qué existe en un territorio. El conocimiento sobre la diversidad faunística se ha ido generando gracias al esfuerzo de investigadores e instituciones que han dimensionado su verdadera importancia, sin embargo, la información se ha presentado de manera dispersa y en muchos casos en datos no publicados, lo cual constituye un obstáculo para la toma de decisiones cuando de estrategias de conservación se trata.

Corantioquia realizó el análisis de la información que se ha generado en su jurisdicción sobre la fauna silvestre, encontrando en su búsqueda 205 publicaciones cuyo análisis se presenta en el texto.

Esta publicación representa el estado del conocimiento de la diversidad de la fauna silvestre en la jurisdicción de Corantioquia, específicamente sobre la diversidad de vertebrados terrestres y voladores. Obedece a la compilación y sistematización de información de las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 20 años, según lo referencian los estudios e investigaciones realizadas por expertos en cada uno de los temas: Andrés Mauricio Cuervo Maya, Compendio de la Aves Reportadas en la Jurisdicción de Corantioquia; Javier Muñoz Arango, Carlos Arturo Cuartas-Calle, y Miriam González, Murciélagos del Área Jurisdicción de Corantioquia; Sandra P. Galeano Muñoz, Anfibios y Reptiles reportados en el área de jurisdicción de Corantioquia y Carlos Arturo Cuartas-Calle, Mamíferos no voladores reportados en el área Jurisdicción de Corantioquia.

El compendio reporta 117 especies de anfibios pertenecientes a 11 de las 14 familias registradas para el país, 65 (55.5% de ellas son endémicas); 107 especies de reptiles pertenecientes a 14 de las 25 familias reportadas para el país, 23 (21.49% de las cuales son endémicas para el país). 114 especies de mamíferos no voladores, lo que representa el 44,71% de las 255 reportadas en el país, de las cuales 19 son endémicas de Colombia y 41 afrontan problemas de conservación. En cuanto a los mamíferos voladores están reportados para la jurisdicción 128 especies que representan el 71.91%, de las 178 reportadas para Colombia.

Somos conscientes que con sólo saber lo que se tiene no basta, se requiere tener un conocimiento biológico básico de las especies, del hábitat que ocupan, las interacciones con otras especies y con el medio, aspectos que permiten inferir sobre la viabilidad de las poblaciones y su vulnerabilidad, igualmente identificar las áreas que concentren las especies amenazadas en esta región, esta publicación aporta información que permiten identificar los esfuerzos que han sido realizados al menos con 14 especies por parte de Corantioquia.

Para el caso de las aves existen reportadas 797 especies y muy posiblemente otras 63 existan en los ecosistemas de la jurisdicción, de este gran total, 19 son especies endémicas para la jurisdicción de Corantioquia y 45 afrontan problemas de conservación.

Sabemos que la información que aquí se publica es parcial pero que servirá de base para motivar la generación de nuevo conocimiento, sustrato de partida para nuevas investigaciones, tema de análisis y discusión; pero sobretudo el punto de conjunción que permitirá la generación de propuestas que propendan por la conservación de este importante componente de la vida, en el mundo que nos correspondió vivir y que le corresponderá vivir a las generaciones venideras.



Corantioquia y su jurisdicción

El espacio está disponible para el inquieto, no existirán barreras que impidan trasegar en su búsqueda, el límite solo es posible en el juicio perverso del egoísta, que le teme a saberse universal.

2. CORANTIOQUIA Y SU JURISDICCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), es una entidad de carácter público de orden Nacional, creada por la ley 99 de 1993, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, responsable de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

La jurisdicción de Corantioquia limita con otras Corporaciones Autónomas Regionales tanto de Antioquia como de otros departamentos vecinos, para su administración y manejo se ha subdividido en 8 Direcciones Territoriales, así: Aburrá Norte (AN), Aburrá Sur (AS), Cartama (CA), Citará (CI), Hevéxicos (HE), Tahamíes (TH), Panzenú (PA) y Zenufaná (ZE) (Tabla 1, Figura 1).

El territorio es complejo y presenta una gran heterogeneidad en cuanto a clima, relieve, paisaje, cultura de sus habitantes y medio ambiente. Geográficamente, está en la Cordillera Central en su extremo norte, la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, los valles interandinos de los ríos Cauca, Magdalena y del Porce-Nechí y la vertiente occidental de la Serranía de San Lucas, geografía que determina una alta diversidad de paisajes que van desde las llanuras aluviales hasta las cumbres andinas.

La jurisdicción de Corantioquia pertenece al área hidrográfica del Caribe, donde la mayor parte de su territorio está en la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, y una pequeña porción en la cuenca del río Sinú (Parque Nacional Natural Paramillo). Dentro de éstas, se encuentran clasificadas 228 cuencas con un tamaño mínimo de 4000 hectáreas, en las cuales se destacan las de los ríos Cocorná Sur, Nare, San Bartolomé, Cimitarra, San Jorge, Samaná Norte, Nus, Volcán, Alicante, Ité, Tamar, Arma, San Juan, San Andrés, Espíritu Santo, Tarazá, Man y Porce-Nechí (Figura 1. Mapa jurisdicción de Corantioquia).

La diversidad de regiones, climas y complejidad geográfica, posibilitan la existencia de una variedad de ecosistemas que comprenden desde bosques muy húmedos tropicales hasta los bosques alto andinos y los páramos, los cuales hacen parte de los cinco grandes biomas reconocidos para el área de la jurisdicción: zonobioma de los bosques húmedos tropicales de tierras bajas, zonobioma de los bosques secos

de tierras bajas, orobioma de los bosques subandinos o premontanos, orobioma de los bosques andinos o montano bajos, orobioma de los páramos y subpáramos

Esta diversidad de paisajes determina un uso del territorio en el que se pueden encontrar desde actividades propias de la metrópoli como industria, comercio y servicios en el Área Metropolitana, hasta actividades de tipo extractivo como la minería y el aprovechamiento forestal. También se encuentran actividades agrícolas, donde se destacan la caficultura y la fruticultura, otras asociadas a la ganadería de carne en las llanuras aluviales de los ríos Cauca y Magdalena y de leche en el altiplano norte (CORANTIOQUIA, 2007).

La jurisdicción de Corantioquia, con excepción de los páramos y humedales posee condiciones biofísicas propicias para el crecimiento de ecosistemas forestales, razón por la cual es de suponer que originalmente los bosques naturales correspondían a la cobertura vegetal predominante en este territorio. Para el año 2002 se conservaba una extensión aproximada de 8.740,8 km² de los bosques naturales equivalentes al 24,2% de la jurisdicción, siendo la cobertura natural la de mayor representación. Estos ecosistemas se ubican principalmente en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Norte en su mayoría en los municipios de Anorí, Amalfi, Cáceres, El Bagre, Ituango, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Tarazá, Segovia, Yondó y Zaragoza y en menor proporción en

Tabla 1. Municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

TERRITORIALES*	MUNICIPIOS	ÁREA (Km ²)	POBLACIÓN**
ABURRÁ NORTE	Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa	885	2.732.324
ABURRÁ SUR	Amagá, Angelópolis, Armenia, Caldas, Envigado, Heliconia, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Titiribí	806	634.131
CARTAMA	Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia	1.577	130.749
CITARÁ	Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín y Salgar	2.077	155.721
HEVÉXICOS	Anzá, Buriticá, Caicedo, Ebéjico, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán	2.516	103.066
TAHAMÍES	Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entreríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y Yarumal	8.275	235.382
PANZENÚ	Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza	9.030	260.357
ZENUFANÁ	Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó y Yondó	10.818	210.324
TOTALES		35.984	4.462.054

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019 (CORANTIOQUIA, 2007)

* Estas denominaciones, realizadas por la Corporación, se dieron como homenaje a los pobladores antiguos de cada región, que habitaron los territorios a la llegada de los españoles.

** La información de población se obtuvo de la página del DANE, datos del censo 2005.




Figura 1. Mapa de la jurisdicción de Corantioquia.

zonas altas de la Cordillera Occidental, en el Suroeste de Antioquia, en los municipios de Caramanta, Támesis, Jardín, Andes y Ciudad Bolívar.

En la actualidad, la vegetación natural y en especial los bosques, están sujetos a una fuerte presión por parte del hombre, debido principalmente a la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de madera y otros productos, el establecimiento de cultivos cuyas producciones son usadas de manera ilícita y la minería ilegal, actividades que en conjunto ocasionan la fragmentación y destrucción cada año de extensas áreas, siendo la pérdida del bosque uno de los problemas ambientales más graves en el territorio de la jurisdicción, donde se estima una tasa de deforestación anual del orden de 24.584 hectáreas (245,84 km²), lo cual indica que de continuar este ritmo, en 30 años se agotaría.

La destrucción de los bosques ha traído como consecuencias el empobrecimiento de los ecosistemas, la pérdida de su capacidad productiva y de regulación de los ciclos

naturales del agua; la erosión y pérdida de suelos con la consecuente sedimentación de cauces y el aporte de grandes cantidades de gas carbónico a la atmósfera por la quema o degradación de la materia orgánica acumulada en el bosque y en el suelo, lo que disminuye sus posibilidades de uso y de aporte de bienes y servicios al hombre. Además de generar la pérdida de la biodiversidad, al ser los bosques el hábitat de muchas especies de flora, fauna, hongos y microorganismos.

Paradójicamente, en las regiones donde aún se conserva una importante cobertura boscosa, y por ende, una alta riqueza en biodiversidad, las comunidades que las habitan se encuentran afectadas por la alta marginalidad, reflejada en los elevados niveles de necesidades básicas insatisfechas, ocurrencia de conflictos armados, proliferación de cultivos de uso ilícito y estructuras de comercialización muy incipientes, que no reconocen el esfuerzo en que incurren las poblaciones debido a que la actividad se limita al proceso de extracción y es poco el valor agregado en torno a ella. Así mismo, el escaso encadenamiento con sectores industriales y/o artesanales y el aprovechamiento de productos distintos o alternativos a la madera, como fauna, aceites, fibras, frutos y flores, así como una producción agropecuaria marginal destinada básicamente al autoconsumo.

En la jurisdicción existen 51 comunidades indígenas con una población estimada de 8.656 habitantes, pertenecientes a las etnias Emberá Chamí, ubicadas en el Suroeste; Emberá Katío, localizadas en el Norte y Bajo Cauca, en área de influencia del Parque Nacional Natural Paramillo y los Senúes, en el Bajo Cauca y Nordeste. También existen comunidades afrocolombianas, en su mayoría de economía campesina, las cuales se ubican principalmente en las regiones de Occidente (Sopetrán), Valle de Aburrá (Girardota), Altiplano Norte (Santa Rosa de Osos, Belmira y San Pedro de los Milagros), Nordeste (Segovia), Magdalena Medio (Yondó) y Bajo Cauca (El Bagre y Zaragoza). La población afrocolombiana está integrada en pequeñas comunidades, donde el proceso histórico asociado a la época colonial, determinó su ubicación, en la actualidad se presenta un creciente flujo de población proveniente del Chocó hacia el Valle de Aburrá y hacia las zonas mineras (Corantioquia, 2007).



Estado del
conocimiento

La verdad de ayer no es necesariamente, la misma de hoy, y la de mañana; quizás sea antagónica con la de hoy, porque muta constantemente, como la vida misma.

3. ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Con el fin de conocer el estado actual de la información que se ha generado en la jurisdicción de Corantioquia sobre la fauna silvestre, se visitaron bibliotecas y centros de documentación donde se conocía la presencia de estos estudios. Se registraron en total 205¹, a cada uno de los cuales se les tomó información como referencia bibliográfica, área de estudio y metodologías utilizadas entre otros; así mismo, se realizó el resumen describiendo los objetivos y resultados generales.

Con el fin de mejorar la comprensión sobre los alcances de estos estudios se dividieron en las siguientes categorías:

3.1. GRUPOS FAUNÍSTICOS

La mayor cantidad de estudios aborda al grupo de aves como objetivo (41%) como se puede observar en la Figura 2. Esto se debe posiblemente a que las aves son animales carismáticos, fácil de ser detectados y abundantes en nuestros ecosistemas, además, por lo general su estudio no requiere metodologías costosas o que demanden mucho tiempo.

En segundo lugar se ubican los estudios de mamíferos (mamíferos voladores y no voladores) con un 22% del igualmente distintos, recíprocamente disimiles, así somos los que nos relacionamos en busca de la supervivencia. total de los trabajos consultados. Un 20 % de los estudios reportados abordaron a más de un grupo faunístico como objeto de estudio (varios).

En último lugar están las investigaciones relacionadas con la herpetofauna (3%) y reptiles (2%), que han tenido como principal objetivo realizar inventarios o estudios de carácter taxonómico.




Figura 2. Porcentaje de estudios por grupo faunístico.

1 En el anexo 1: Estudios e inventarios realizados con el apoyo de Corantioquia, relacionados con el componente de fauna silvestre se presenta el listado de los trabajos que han sido auspiciados económica o logísticamente por la Corporación.

3.2. OBJETO DE ESTUDIO

La mayoría de estos trabajos son inventarios que se caracterizan por la composición de las comunidades, de éstos los locales son los más comunes. En los documentos revisados también hay una considerable cantidad de estudios enfocados a la ecología de especies y sus comunidades (Figura 3).

El 32% de los estudios recopilados tuvieron como objetivo conocer la presencia de las especies de fauna en un área determinada, el 20% están direccionados a describir las relaciones entre las distintas especies presentes en un ecosistema, lo que en términos generales se concibió como estudios de ecología.

Los referentes a la taxonomía representan el 15% del total, los cuales abordan principalmente grupos como anfibios y mamíferos, varios de estos estudios describen especies nuevas y algunos incluyen aspectos de morfología animal.

Los estudios relacionados con planes de manejo (10%) abordan principalmente las áreas de reservas, seguidos por ecoparques, proyectos hidroeléctricos y cuencas, en general buscan determinar las estrategias de conservación de la fauna asociada a estos sitios que puedan ser afectados por cualquier actividad antrópica que allí se realice (turismo, construcción de vías, establecimiento de poblaciones humanas, entre otros).

El 7% se refieren al tratamiento de la fauna silvestre, en éstos se describen acciones tendientes a la recuperación, manejo y reubicación de los ejemplares que han sido rescatados mediante los diferentes mecanismos implementados para este fin, tanto por Corantioquia como por las instituciones con función de policía; la mayoría de estos estudios se llevaron a cabo en las instalaciones de los centros de valoración, tratamiento y rehabilitación que realizan esta actividad en el área de su jurisdicción.




Figura 3. Porcentaje de estudios por objeto de estudio.

Los estudios de conservación (6%) están relacionados con la caracterización, evaluación y análisis de las amenazas más importantes para una o varias especies, por ejemplo, la pérdida de hábitat, la cacería de subsistencia o el uso de la fauna silvestre como mascota, generando información que puede ser utilizada como base para proponer estrategias con el fin de disminuir estas presiones y evitar la disminución poblacional, la extinción local y general de estas especies.

Los documentos relacionados con la zoonosis hacen referencia al estudio de los ecto y endoparásitos, responsables de enfermedades o posibles vectores y corresponden principalmente a investigaciones desarrolladas en mamíferos y dentro de este grupo en quirópteros principalmente.

Por último, encontramos los estudios acerca de la fisiología que están enfocados en la función reproductiva de diversas especies con el fin de obtener información útil para su conservación, y los de carácter genético que buscan la caracterización de poblaciones en cautiverio, de las cuales no es conocida su procedencia verazmente, para poder determinar las zonas de liberación adecuadas para cada uno de los ejemplares, estos estudios se han realizado principalmente en primates.

3.3 METODOLOGÍA CAPTURA DE DATOS

Fueron variadas las metodologías utilizadas en las investigaciones en fauna realizadas en la jurisdicción de Corantioquia. La observación directa es la más común debido seguramente a que se puede llevar a cabo sin ningún tipo de instrumento especial o sólo con el uso de binóculos, después están las que utilizan redes de niebla, principalmente, para investigaciones de aves y murciélagos, también se reporta la revisión de información secundaria, las encuestas y la revisión de especímenes de museo que fueron utilizadas en su mayoría para trabajos de orden taxonómico.




Figura 4. Metodologías más utilizadas en los estudios de fauna.

3.4. INVESTIGACIONES A LO LARGO DEL TIEMPO

Durante los primeros 70 años del siglo XX no se registró ninguna publicación, muy posiblemente la información generada en este periodo se encuentra dispersa o en centros de documentación en el exterior, a los cuales no se tuvo acceso.

A partir de mediados de la última década del siglo XX se observa un incremento en la actividad investigativa, en donde indiscutiblemente la creación de Corantioquia en el año de 1995, contribuyó significativamente a los estudios adelantados en los diferentes grupos faunísticos.

El incremento de estudios en los últimos años, demuestra el interés por conocer y conservar el recurso fauna, impulsado por las amenazas que sobre este componente de la diversidad se presentan en el mundo y en el país, debido principalmente a la destrucción del hábitat y la presión generada sobre el recurso.

3.5. MODALIDAD DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

El 39% de los documentos corresponden a informes en donde se reportan las actividades desarrolladas en cumplimiento de la ejecución de contratos con Corantioquia. De estos, el 40% incluyen más de un grupo faunístico y el 34%, sólo a las aves. Generalmente son inventarios de la riqueza de especies en una región. También se encuentran listados de especies con base en información secundaria.

Las tesis de pregrado representan el 24% de los estudios, corresponden a las carreras de Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería Agrónoma. Las universidades más representativas son la Universidad Nacional sede Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional sede Bogotá. El 47% corresponde a estudios en aves y el 35% en mamíferos.

En el mismo nivel de importancia que las tesis se encuentran los artículos, es decir, documentos publicados en revistas. El 43% de ellos son concernientes a las aves, se documentan los resultados de investigaciones ecológicas y taxonómicas principalmente. Los artículos relacionados con los otros grupos faunísticos se refieren a taxonomía y sistemática de especies, y se revisan o describen nuevas especies, en especial anfibios.

También se encontraron tesis de maestría (4%) (Maestría en Silvicultura y Manejo de Bosques, Maestría en Ecología, Maestría en Bosques y Conservación Ambiental, Maestría en Ciencias Biomédicas) y el 3% son folletos que se refieren a publicaciones pequeñas, suplementos, seminarios, cartillas y algunos libros que representan el 4% del total.

3.6. ESTUDIOS POR TERRITORIAL

De las ocho Direcciones Territoriales en que está dividida administrativamente la jurisdicción de Corantioquia, es en Aburrá Norte donde más estudios se han desarrollado y es el municipio de Medellín donde se ha presentado un mayor esfuerzo investigativo, reportando el 69% de los estudios evaluados. El grupo faunístico más investigado en esta Dirección Territorial son las aves (48%) y a su vez es la Dirección Territorial en la que se han realizado más estudios en este grupo, 29% de las investigaciones en aves reportadas.

La Dirección Territorial Tahamíes ocupa el segundo lugar en número de estudios desarrollados 18%, pero a diferencia de la anterior, en ésta se han desarrollado estudios en casi la totalidad de sus municipios (16 de 17), tan solo en el municipio de Guadalupe no se reportaron estudios. Con esto se evidencia un esfuerzo de investigación menos centralizado, aunque en el municipio de Belmira se reportan el 20% del total de la Dirección Territorial, seguido por Anorí con el 15%. El 38% de los estudios tratan el grupo faunístico de aves y es la segunda Dirección Territorial en abordar este tema con el 21% del total.

La Dirección Territorial Aburrá Sur alcanza un 13% del total de estudios reportados, de estos el 48% fueron realizados en el municipio de Caldas. Con la excepción del municipio de Amagá en el resto de los municipios que cubre esta Dirección Territorial se reportaron estudios. Los grupos faunísticos más abordados son aves y mamíferos, el 33% para cada uno; además el grupo de mamíferos en esta Dirección Territorial representa el mayor número de estudios respecto a toda la jurisdicción, el 24%.

El otro 50% de los documentos reportados se distribuyen así: En Zenúfaná se han desarrollado investigaciones en el 67% de sus municipios y el 29% de estos se han hecho en el municipio de Amalfi. En Hevéxicos hay una cobertura del 70% de sus municipios y el 24% han sido adelantados en el municipio de Santa Fe de Antioquia. En la Dirección Territorial Panzenú, se han realizado estudios en la totalidad de sus municipios y el 37% han sido en el municipio de Valdivia. En Cartama, se han desarrollado estudios en 9 de sus 11 municipios, Jericó ha sido el municipio con mayor número. En la Dirección Territorial Citará se han realizado estudios en el 75% de sus municipios, siendo el municipio de Jardín el que reporta la mayor cantidad con un 39% del total.




Figura 5. Estudios de fauna realizados a lo largo del tiempo.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia




Figura 6. Número de estudios realizados por tipo de publicación.




Figura 7. Porcentaje de estudios por Dirección Territorial.

En términos generales, los esfuerzos de investigación han estado enfocados en casi todo el territorio de la jurisdicción, considerando principalmente las áreas de interés en términos de conservación o regiones que poseen alguna importancia económica, como el caso del municipio de Medellín y el municipio de Caldas en donde se encuentra el Alto de San Miguel, sitio de nacimiento del Río Aburrá en donde se han desarrollado el 47% de los estudios. Otro caso importante lo representa el municipio de Belmira que cuenta con un ecosistema de páramos, considerado reservorio y fuente de agua para toda la región del Valle de Aburrá, y en la cual se han realizado 14 estudios que representan el 7% del total.

La construcción de proyectos hidroeléctricos ha impulsado el desarrollo de estudios de impacto ambiental, los cuales contribuyen con información acerca de la composición faunística de la zona de influencia como es el caso de los proyectos hidroeléctricos Porce II (Amalfi), Nechí (Valdivia) y Río Piedras (Jericó).




Figura 8. Número de estudios para cada grupo faunístico realizados por Dirección Territorial



Diversidad de
especies de fauna

Igualmente distintos, recíprocamente disimiles, así somos los que nos relacionamos en busca de la supervivencia.

4. DIVERSIDAD DE ESPECIES DE FAUNA EN LA JURISDICCION

El territorio de Corantioquia, alberga una gran diversidad de especies, este compendio reporta 1262 especies de vertebrados terrestres y voladores y posiblemente 63 especies de aves y 17 de murciélagos más y cuya confirmación está en proceso (ver tabla 1). Se destaca proporcionalmente la alta representatividad de mamíferos no voladores con el 78% de las especies presentes en el país así mismo el 42.75 de las especies de aves, el 16% de los anfibios y el 21 % de los reptiles reportadas para Colombia se encuentran en los ecosistemas que componen esta jurisdicción; 127 de estas especies son endémicas para nuestro país, algunas de las cuales presentan endemismos regionales o locales, cabe resaltar que el 55.5% de los anfibios registrados están bajo esta categoría de endemismo lo propio ocurre con 23 especies de los reptiles reportados, 19 de aves y mamíferos no voladores y una especie de quirópteros. Sin embargo de todas estas especies 106 afrontan problemas de conservación siendo las aves y los mamíferos no voladores los más amenazados; la alteración de los hábitat y la sobreexplotación son principales causas para el riesgo de pérdida de nuestras especies silvestres.

A continuación se presenta el resumen de cada uno de los grupos taxonómicos, contemplados para este trabajo: Aves, Mamíferos no Voladores, Mamíferos Voladores, Anfibios y Reptiles, en cada capítulo se incluyen las tablas correspondientes, información tomada de las investigaciones realizadas expertos en cada tema.

4.1 AVES

Es bien sabido que Colombia es el país de las aves, aún se siguen descubriendo especies nuevas para la ciencia, en la medida en que se hacen investigaciones en el país. Gran parte de los recientes descubrimientos de aves se han hecho en el departamento de Antioquia, especialmente en jurisdicción de Corantioquia, lo representa por ejemplo el descubrimiento de las siguientes especies: *Lipaugus weberi* en bosques de Anorí y Amalfi (Cuervo et al. 2001), *Scytalopus stilesi* en bosques premontanos de la Cordillera Central (Cuervo et al. 2005), *Coeligena orina* en Farallones del Citará (Pulgarín & Múnera 2005) y otras especies de aves nuevas para esta región (Cuervo et. al 2006), lo anterior es una muestra clara de que no sólo Antioquia es un departamento aún por descubrir desde la ornitología, sino que, estamos lejos de producir un listado completo de las aves existentes en la jurisdicción de Corantioquia.

Esta publicación suministra un listado de las especies de aves reportadas en nuestra jurisdicción, construida con base en la literatura, en consultas de bases de datos de colecciones científicas y datos personales no publicados. Se espera que esta información le permita a Corantioquia establecer cuáles son las aves y las regiones en las que es más prioritario realizar proyectos de investigación y/o conservación.

El listado tiene como base las observaciones confiables y evidencias verificables de la presencia de especies de aves en la jurisdicción de Corantioquia. Las evidencias en la ciencia tienen que ser verificables, por lo tanto, se tienen en cuenta principalmente los especímenes de museo y las grabaciones de sonidos, y en menor medida los registros visuales auditivos o evidencias limitadas como las fotografías; infortunadamente la región posee una desventaja abismal en comparación con otras regiones del país y es que no fue posible extraer información suficiente de los museos de historia natural, una fuente de información importante para la biodiversidad y la biología.

Esto se debe a que las colecciones de aves realizadas en la región son pocas e incipientes y no parece que este panorama vaya a cambiar mientras no existan propuestas de investigación sistemáticas para aportar información a las colecciones biológicas en la región. Un reflejo de la falta de colecciones ornitológicas en Antioquia, son los descubrimientos recientes hechos en el departamento, que tendrían que haberse hecho hace 50 ó 100 años; no en vano Antioquia es considerada el secreto mejor guardado de la ornitología colombiana. Quizás muchas especies de aves se han extinguido, y ahora solo quedan los paisajes deforestados que dominan muchas las regiones del departamento.

Los datos que aportan las colecciones hechas en la jurisdicción (de catálogos de museos en línea), son el grueso de información que soporta este compendio.

El tratamiento taxonómico empleado es el más actualizado para las aves de Colombia (Remsen et al. 2006) incluyendo el nombre estandarizado en inglés. Los nombres vernáculos en español se tomaron de la Guía en español de las aves de Colombia (Hilty, S. L. & W. Brown W.L, 2001). Se presenta una columna que contiene otros nombres o sinónimos de la nomenclatura actual que permita la homologación de información desactualizada. En esta base de datos existe información general sobre la distribución de las aves en las ocho Direcciones Territoriales de Corantioquia y las categorías de amenaza nacional y grado de endemismo.

Este compendio incluye un total de 860 especies de aves con registros en la jurisdicción de Corantioquia, de las cuales, unas 63 están por verificar, de hecho podría confirmarse su presencia en alguna región de la jurisdicción en estudios futuros. Por tanto el listado final cuenta con 797 especies de aves, incluyendo registros históricos de especies que no se han vuelto a

Tabla 2. Número de especies de AVES por Dirección Territorial

Dirección Territorial	Nº Especies
CITARÁ	344
CARTAMA	331
HEVEXICOS	246
ABURRA SUR	354
ABURRA NORTE	420
TAHAMÍES	421
ZENUFANA	400
PANZENÚ	355

reportar recientemente o accidentales. Las 860 especies de la lista están agrupadas en 20 órdenes, 69 familias y 461 géneros.

Las Direcciones Territoriales con más reportes fueron Tahamíes, Aburrá Norte y Zenufaná, lo que refleja su gran riqueza de aves, pero también que han sido más estudiadas.

En las Direcciones Territoriales Tahamíes, Aburrá Norte y Zenufaná hay reportes para 19 especies endémicas para Colombia, de las cuales sobresale el Arriero Antioqueño (*Lipaugus weberi*), la única especie cuya distribución está totalmente incluida en territorio de Corantioquia. Las otras especies endémicas son: *Ortalis garrula*, *Crax alberti*, *Odontophorus hyperythrus*, *Coeligena orina*, *Capito hypoleucus*, *Picumnus granadensis*, *Melanerpes pulcher*, *Grallaria alleni*, *Scytalopus stilesi*, *Phylloscartes lanyoni*, *Myiarchus apicalis*, *Lipaugus weberi*, *Bangsia melanochlamys*, *Chlorochrysa nitidissima*, *Dacnis hartlaubi*, *Diglossa gloriosissima*, *Habia gutturalis*, *Habia cristata* y *Hypopyrrhus pyrohypogaster*.

En la jurisdicción de Corantioquia, 46 especies se encuentran amenazadas o casi-amenazadas, de las cuales las más importantes para conservación son: *Crax alberti*, *Ognorhynchus icterotis*, *Lipaugus weberi*, *Tinamus osgoodi*, *Crypturellus erythropus*, *Oxyura jamaicensis*, *Harpyhaliaetus solitarius*, *Oroaetus isidori*, *Coeligena orina*, *Capito hypoleucus*, *Clytoctantes alixii*, *Grallaria alleni*, *Phylloscartes lanyoni*, *Diglossa gloriosissima*, *Hypopyrrhus pyrohypogaster*.

4.2 MAMÍFEROS NO VOLADORES

La información sobre este importante grupo fue en su mayoría compilada por el investigador Carlos Arturo Cuartas Calle, Biólogo-Zoólogo de la Universidad de Antioquia en el documento titulado mamíferos no voladores reportados en el área de jurisdicción de Corantioquia.

Este documento se realizó con base en los registros e información de los trabajos de campo por cerca de 13 años de investigación y de colección del material científico por parte del autor, y de revisión bibliográfica de los trabajos realizados por especialistas reconocidos en el tema. Para este caso se describen 114 especies de las 115 registradas para la jurisdicción y se resumen las características externas, craneales y la historia natural de cada especie. Como complemento de la parte descriptiva, se adicionan fotografías y dibujos de cada una de ellas. Además se presentan mapas con la distribución de las especies con base en registros de capturas y observaciones hechas en los trabajos de campo por el autor y otros investigadores nacionales e internacionales.

Para el estado de conservación de este grupo, se tomó como referencia la Lista de Estatus de Conservación de los Mamíferos Neotropicales, las categorías siguen la Lista Roja de especies de fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a nivel nacional e internacional (IUCN, 2003).

Los mamíferos no voladores, presentan una amplia distribución en el área de Corantioquia y se hallan en todos los pisos zoogeográficos por lo que se encuentran en una gran variedad de hábitat, desde bosques primarios hasta áreas urbanas. Las especies presentes en los municipios del área de nuestra jurisdicción, están distribuidas en zonas desde los 0 hasta los 4.200 msnm.

Hasta la fecha, para el área de la jurisdicción de Corantioquia, han sido reportadas

Dirección Territorial	Nº de especies
CITARÁ	62
CARTAMA	55
HEVEXICOS	47
ABURRA SUR	44
ABURRA NORTE	43
TAHAMÍES	76
ZENUFANA	82
PANZENÚ	93

Tabla 3. Número de especies de MAMÍFEROS NO VOLADORES por Dirección Territorial

115 especies de mamíferos no voladores, lo que representa el 44,71% de las 255 reportadas para Colombia.

La estructura jerárquica, conformada por los órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies de los mamíferos reportados para el área, muestra una gran riqueza e indica que el área tiene una alta representatividad de la mastofauna presente en el territorio colombiano. La conformación jerárquica de las especies de mamíferos reportados está compuesta por: 13 órdenes, 30 familias, 26 subfamilias, 79 géneros y 115 especies.

El rango de distribución de las especies de mamíferos no voladores reportados para el área de la jurisdicción de Corantioquia, se cataloga como amplia y alta densidad: 30 especies (26,3%); con amplia distribución y baja densidad 28 especies (24,6%); con distribución restringida 37 especies (32,5%) y endémicas 19 especies (16,6%).

El hábito espacial de las especies reportadas para el área de la jurisdicción de Corantioquia está representado por: terrestres con 60 especies (52,6%); los terrestres/arbóreos con 21 especies (18,4%); los arborícolas con 27 especies (23,7%); los semiacuáticos con 6 especies (5,3%) y los acuáticos con 1 especie (0,9%).

Para las especies con distribución restringida y alta densidad, se presentan requerimientos específicos en cuanto al hábitat que ocupan como el caso de los primates marteja (*Aotus lemurinus*), mono aullador (*Alouatta seniculus*) y mico cariblanco (*Cebus albifrons*); los carnívoros zorro perro (*Cerdocyon thous*) y nutria (*Lontra longicaudis*); los roedores ardilla alazana (*Sciurus granatensis*), ardilla cusca (*Microsciurus mimulus*), ratón de agua (*Nectomys squamipes*), erizo (*Coendou prehensilis*) y conejo negro o ñeque (*Dasyprocta punctata*). En contraste con las especies de distribución amplia como chucha gallinera (*Didelphis marsupialis*), armadillo común (*Dasypus novemcinctus*) y el conejo (*Sylvilagus brasiliensis*), entre otros.

Algunas especies son demográficamente raras, es decir, presentan densidades bajas en toda el área de distribución, aunque su distribución sea amplia y no estén asociadas a hábitat muy específicos, como sucede con los felinos gato de monte (*Herpailurus yaguarundi*), tigrillo (*Leopardus wiedii*), tigre macheto (*Leopardus pardalis*); los carnívoros hurón (*Eira barbara*), mapache (*Rocyon cancrivorus*); el oso hormiguero (*Tamandua mexicana*) y el serafín (*Cyclopes didactylus*), entre otros.

Entre los mamíferos reportados se encuentran especies adaptadas para movilizarse mejor en el agua como la nutria, la chucha de agua y las ratas de agua; para excavar como los armadillos; especies arborícolas como primates, perezosos, algunos marsupiales y algunas ratas; otros están adaptados para movilizarse en tierra y árboles como algunos marsupiales, el oso hormiguero, el hurón, cusumbo, entre otros; y otra gran mayoría se han adaptado al terreno firme (terrestres).

4.3 MAMÍFEROS VOLADORES

La información sobre este importante grupo fue compilada por los investigadores Javier Muñoz Arango, profesor del Instituto de Biología Universidad de Antioquia; Carlos Arturo Cuartas Calle, Biólogo-Zoólogo Universidad de Antioquia y Miriam González, Bióloga Universidad de Antioquia en el documento titulado murciélagos del área jurisdicción de Corantioquia.

En éste se describen 145 especies de murciélagos y se resumen las características externas, craneales, la historia natural, el hábitat, las dietas alimenticias y la importancia ecológica de cada especie. Como complemento de la parte descriptiva, se adicionan fotografías y dibujos de cada una de las especies la mayoría con su respectivo cráneo.

Además se incluyen los mapas de distribución de cada una de ellas en el área jurisdicción de Corantioquia, tanto para las especies de registro comprobado como para las de posible presencia, información basada en las capturas y observaciones realizadas en los trabajos de campo por los autores y otros investigadores nacionales e internacionales.

Para el estado de conservación se tomó como referencia la Lista de Status de Conservación de los Murciélagos Neotropicales (Wilson, 1992), las categorías siguen la Lista Roja de especies de fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 1994) en los niveles internacional y nacional; finalmente, las palabras técnicas se explican en el glosario.

La recopilación de información realizada para esta publicación se basó en registros y trabajos de campo, que son el resultado de cerca de 25 años de investigación y de colección del material científico por parte de los autores y de varios grupos de colaboradores que se realizaron en diferentes departamentos de Colombia y varios municipios del departamento de Antioquia.

El material está archivado en la colección del Museo de la Universidad de Antioquia, además se obtuvo información de los ejemplares que se encuentran depositados en el Museo del Colegio de San José de Medellín. También se incluyó información de revisiones bibliográficas mencionadas en la literatura a nivel nacional y mundial por especialistas reconocidos en el tema.

Ésta es sin duda una muy buena base para continuar profundizando en el conocimiento de las especies de murciélagos presentes en el área de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, además de ser una fuente confiable de consulta para profesionales de las áreas de biología y zoología y para personas interesadas en la conservación de nuestra fauna y su medio ambiente.

Los murciélagos constituyen el grupo más abundante tanto por el número de especies, como de individuos por especie para nuestro país, pues de las 930 especies de murciélagos reportados actualmente para el mundo, Colombia posee 178 especies (19.14%) y en este compendio se estima la presencia de 145 especies (81.46%) para la jurisdicción de Corantioquia, pertenecientes a 9 familias y 6 subfamilias, de las cuales 128 especies están plenamente confirmadas y 17 corresponden a especies con presencia probable debido a que se encuentran en otros municipios o departamentos colindantes al área de la jurisdicción.

Los murciélagos presentan una amplia distribución en el área jurisdicción de Corantioquia encontrándoseles desde los 0 hasta los 3.900 msnm. Existen especies generalistas que viven en una gran variedad de hábitat, desde bosques primarios hasta áreas urbanas, como sucede con las especies *Artibeus jamaicensis*, *A. lituratus*, *Carollia perspicillata* y *Molossus molossus*; también hay especies raras o de distribución restringida que son conocidos en pocas localidades como *Mormoops megalophylla*, *Rhynchonycteris naso*, *Saccopteryx antioquensis*, entre otras. Los géneros *Artibeus*, *Carollia*, *Platyrrhinus* y *Sturnira*, son los más abundantes y con mayor distribución.

En la Dirección Territorial Citará se reportan 6 familias (Emballonuridae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Thyropteridae, Vespertilionidae y Molossidae); En Cartama se encuentran 5 familias (Emballonuridae, Phyllostomidae, Thyropteridae, Vespertilionidae y Molossidae); en Hevéxicos se encuentran 8 de las 9 familias excepto Noctilionidae; en Aburrá Sur están presentes 3 familias (Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae); en Aburrá Norte hay 4 familias (Emballonuridae, Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae); en Tahamíes tenemos a 7 familias (Emballonuridae, Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Thyropteridae, Vespertilionidae y Molossidae).

Finalmente para las Territoriales de Zenufaná y Panzenú se encuentran especímenes representantes de todas las familias reportadas para la jurisdicción.

4.4 ANFIBIOS Y REPTILES

La información que aquí se presenta fue compilada por la investigadora Sandra Galeano en el documento titulado anfibios y reptiles reportados en el área de jurisdicción de Corantioquia, y se basó en información secundaria, visitas a colecciones en museos locales y nacionales.

Se reportan 117 especies de anfibios, 65 (55.5%) de ellas son endémicas, pertenecientes a 11 de las 14 familias registradas para Colombia; éstas se pueden clasificar así: 107 especies de reptiles, 23 (21.49%) de las cuales son endémicas para el país, pertenecientes a 14 de las 25 familias reportadas.

El mayor número de especies de anfibios reportadas para la Jurisdicción corresponden a municipios en las Territoriales de Tahamíes, Zenufaná, Aburrá Norte, Aburrá Sur y Panzenú; mientras que el mayor número de especies de reptiles corresponden a las Direcciones Territoriales de Tahamíes, Zenufaná, Panzenú y Cartama (Tabla 5).

El mayor número de reportes para las Direcciones Territoriales de Panzenú, Tahamíes y Zenufaná, parece obedecer principalmente a la exploración realizada durante los últimos años por miembros del Grupo Herpetológico de Antioquia, en varios municipios pertenecientes a dichas Territoriales, más que a la real presencia de un mayor número de especies de anfibios y reptiles en la región. Este es el caso por ejemplo de los municipios de Anorí, Amalfi, Belmira, Caucasia, Gómez Plata, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y Santa Rosa de Osos, que han sido objeto de estudio para algunas tesis de grado y otros trabajos de interés evaluando su componente de herpetofauna. Sin embargo, la información que se tiene sobre la diversidad de la herpetofauna de los demás municipios pertenecientes a las Territoriales de Tahamíes, Panzenú y Zenufaná es prácticamente nula.

Las Direcciones Territoriales de Aburrá Norte y Aburrá Sur, cuentan con algunos datos gracias al interés por parte del hermano Marco Antonio Serna para el caso de los anfibios, quien realizó sus inspecciones en varios de los municipios de su rango. Para

Dirección Territorial	F A M I L I A									No. De especies	Porcentaje
	Emballonuridae	Noctilionidae	Mormoopidae	Phyllostomidae	Natalidae	Furipteridae	Thyropteridae	Vespertilionidae	Molossidae		
CI	2	0	3	43	0	0	1	7	11	67	46%
CA	4	0	0	48	0	0	1	8	11	72	50%
HE	5	0	5	41	1	1	1	4	11	69	48%
AS	0	0	0	40	0	0	0	6	11	57	39%
AN	1	0	0	30	0	0	0	6	15	52	36%
TA	8	2	2	62	0	0	2	9	12	97	67%
ZE	5	2	5	50	1	1	1	8	12	85	59%
PA	5	2	5	64	1	1	1	12	11	102	70%

Tabla 4. Número de especies de MAMÍFEROS VOLADORES por Dirección Territorial

el caso de Cartama, la revisión realizada por Pérez-Santos & Moreno (1988) fue la que aportó al conocimiento principalmente de la ofidiofauna de la región, razón por la que se ubica en los primeros lugares de mayor número de especies de reptiles. Sin embargo la representación de un alto número de especies de reptiles en la Dirección Territorial Cartama, obedecen al alto número de especies de serpientes conocidas del municipio de Jericó. El conocimiento de las especies presentes en los demás municipios de la Territorial es desconocido.

La distribución del mayor número de especies endémicas parece coincidir con las Territoriales en las que se han reportado también el mayor número de especies, tanto de anfibios como de reptiles. De esta manera, en Tahamíes se encuentra el mayor número de especies endémicas de anfibios y reptiles, seguida por Aburrá Norte y Aburrá Sur en el caso de los anfibios, y por Panzenú y Zenufaná en el caso de los reptiles (Tabla 6).

Finalmente, para el caso de las Direcciones Territoriales de Hevéxicos y Citará es muy poco lo que se conoce en términos de su herpetofauna, ya que se trata de regiones que prácticamente no han sido muestreadas.

Con el objetivo de determinar los lugares con mayor diversidad de especies de anfibios y reptiles en la jurisdicción de Corantioquia sin incluir un sesgo por el muestreo, se hace necesaria la continuación de investigaciones sistemáticas, que incluyan preferiblemente áreas de Direcciones Territoriales como Hevéxicos, Citará y Cartama, y los municipios aún no muestreados de otras Territoriales y que mantengan áreas de bosque y humedales.

TABLA 5. Número de especies de anfibios y reptiles por Dirección Territorial.

Dirección Territorial	Número de especies de anfibios	Número de especies de reptiles
PANZENÚ	34	42
TAHAMÍES	64	60
ZENUFANA	40	42
HEVEXICOS	12	10
ABURRA NORTE	39	15
ABURRA SUR	39	13
CITARÁ	5	6
CARTAMA	5	16

Adicionalmente se espera poder realizar el estudio del estado poblacional, los requerimientos de hábitat y la biología de las especies endémicas, principalmente de aquellas de rango restringido, conocidas únicamente del departamento de Antioquia y/o de su localidad tipo, lo que permitiría ahondar en el conocimiento de las amenazas que éstas enfrentan y así poder plantear las estrategias de conservación apropiadas para las especies y/o sus hábitat.

Tabla 6. Número de especies endémicas de anfibios y reptiles reportados en cada Dirección Territorial.

Dirección Territorial	Número de especies endémicas de anfibios	Número de especies endémicas de reptiles
Panzenú	7	6
Tahamíes	39	9
Zenufaná	15	2
Hevéxicos	5	0
Aburrá Norte	30	3
Aburrá Sur	23	5
Citará	0	1
Cartama	1	4



Gestión de
Corantioquia

Todos los esfuerzos deberán apuntar a lograr avances en la conservación de nuestra diversidad, abundante, variada y, en muchos casos, única.

5. GESTIÓN DE CORANTIOQUIA PARA EL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE

La fauna silvestre ha sido considerada por Corantioquia como uno de los componentes de la biodiversidad más importantes. Por esto ha desarrollado actividades enfocadas a la generación de conocimiento, control al tráfico ilegal, manejo y tratamiento de los animales recuperados y procesos de sensibilización, entre otros; además de la participación de sus funcionarios en los diferentes ejercicios de conservación tanto del orden local como nacional y la implementación de estrategias y acciones direccionadas a la conservación son ejercicios que han permitido posicionar a Corantioquia como una de las autoridades ambientales con más credibilidad en el país en este tema.

A continuación se describen de manera sucinta algunas de las actividades con relación al conocimiento, conservación y manejo de la fauna silvestre por CORANTIOQUIA.

5.1 Generación de Conocimiento

Para esta publicación se consideraron los 95 estudios más relevantes que dan una buena idea de la gestión corporativa entre los años 1995 a 2008 (Ver Anexo 1). Con el fin de analizar de manera objetiva esta información, se agruparon los trabajos en las siguientes categorías:

- Apoyo al conocimiento: Se refiere a investigaciones o trabajos realizados con el fin de compilar, analizar o publicar información basada en fuentes secundarias.
- Distribución: Hace alusión a investigaciones o trabajos que se han apoyado, cuyo objetivo fue determinar la existencia de la(s) especie(s) o de sus poblaciones.
- Manejo y conservación: Investigaciones o trabajos que dan pautas para realizar un manejo tanto in situ como ex situ de la(s) especie(s) o de sus poblaciones.
- Ecología: Investigaciones o trabajos que abordan la autoecología de la especie.
- Caracterización genética: sólo se referencian las Investigaciones o trabajos que contemplen caracterización genética.

Siempre ha existido la preocupación por conocer la diversidad y distribución de fauna presente en el territorio de la jurisdicción, la gran mayoría de estos inventarios se han realizado en áreas de importancia para la conservación, dentro de las cuales están las denominadas Áreas de Reserva de carácter corporativo, municipal, regional y nacional.

Tabla 7. Categoría y número de estudios sobre la fauna silvestre realizadas por CORANTIOQUIA 1995–2008.

Categoría	Nº
Apoyo al conocimiento	10
Distribución	41
Manejo y conservación	32
Ecología	7
Caracterización genética	5
TOTAL	95

Cabe anotar que de los 41 trabajos relacionados con distribución, sólo cuatro consideran el componente fauna de manera general, mientras que los restantes se realizaron enfocados a las diferentes clases taxonómicas: 11 de aves, 15 de mamíferos, 8 de herpetofauna, 2 de peces y 1 de insectos. Con respecto a los trabajos realizados con la clase aves, seis contemplan inventarios generales en áreas específicas, mientras que cinco tuvieron una especie o grupo de especies como objetivo, lo propio ocurre con la clase mamíferos en donde seis inventarios se realizaron de manera general, pero nueve de ellos contemplaron solo una sola especie o grupo de ellas.

Se realizaron 32 estudios e investigaciones en manejo y onservación, de las cuales dos fueron enfocadas de manera general, 14 con la clase aves y 16 con la clase mamíferos, en esta categoría se consideran 14 especies denominadas de importancia y otros nueve trabajos han sido realizados con grupos de especies o una clase en particular.

Los estudios catalogados como ecología, tienen como objetivo profundizar en el conocimiento de las relaciones intra e interespecíficas de las especies consideradas, así como su relación con el medio ambiente.

La clase aves es la que tiene más representación en esta categoría con cuatro trabajos, seguido por los anfibios en donde hay un trabajo específico y uno general, y por la clase mamíferos en donde hay una proyección específica. Es importante resaltar los cinco trabajos enfocados a la caracterización genética, cuatro de los cuales se sitúan en 14 especies de mamíferos y uno en una especie de aves, los avances en este tipo de avances le permiten a Corantioquia tener herramientas más precisas para dilucidar el inventario de su diversidad y son de gran ayuda para definir el destino de un individuo rescatado del tráfico ilegal.

Las especies y grupos considerados de importancia están: Guacamaya Verde (*Ara militaris*), Guacamaya Verde Limón (*Ara ambiguus*), Paujíl de Pico Azul (*Crax alberti*), Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*), Gallito de Roca (*Rupicola peruviana*), Paloma Collareja (*Columba fasciata*), Reinita cielo azul (*Dendroica cerulea*), Perico real (*Broto-genis jugularis*), Oso Andino (*Tremarctos ornatos*), Danta Colombiana (*Tapirus terrestris*), Manatí (*Trichechus manatus*), Tití piel roja (*Saguinus oedipus*), Tití gris (*Saguinus leucopus*), Nutria neotropical (*Lontra longicaudis*), Ponche (*Hydrochaeris hydrochaeris isthmius*), Mono aullador rojo (*Alouatta seniculus*), Perezoso de dos uñas (*Choloepus hoffmanni*), Perezoso de tres uñas (*Bradypus variegatus*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), las ranas *Rhombophryne macrorrhina* y *Eleutherodactylus suetus*, los grupos: Falconiformes migratorios, Quirópteros y la Familia Felidae.

Corantioquia ha participado en la elaboración de instrumentos de conservación de las

especies que han sido determinadas en su jurisdicción, programas y estrategias en su mayoría lideradas desde el MAVDT, pero en otros casos por ONG tanto del orden nacional como internacional. Son precisamente los resultados de estas investigaciones los que aportan los datos y respaldan el estado del conocimiento con que se cuenta en el territorio de nuestra jurisdicción.

5.2 Control al tráfico ilegal

Corantioquia como autoridad ambiental, debe ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables, así como el control de la movilización, procesamiento y comercialización de dichos recursos, en coordinación con entidades Territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos, según lo decreta la Ley 99 de 1993.

Quizás el control al tráfico ilegal ha sido una de las actividades que más ha demandado inversión de tiempo y trabajo a los funcionarios de Corantioquia, toda vez que el uso de la fauna silvestre en calidad de mascota es común en su jurisdicción como lo demostraron los censos de fauna Silvestre en 70 cabeceras municipales que adelantó la institución durante los años 2002 y 2003, y en donde se reportaron 7.816 especímenes tenidos bajo esta condición, además a esta cifra se suma el número considerable de animales que ingresan producto de entregas voluntarias e incautaciones.

Corantioquia hace parte del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia (CIFFA), que se conformó desde el año 1996 con el objeto de unir esfuerzos para controlar y solucionar la irracional explotación de la flora y la fauna silvestre. Este comité está conformado además de Corantioquia por otras instituciones de carácter gubernamental tales como: Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá), Corporación Autónoma Regional de los Ríos Rionegro y Nare (Cornare), Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Secretaría de Medio Ambiente Departamental, Policía Nacional, Ejército de Colombia, DAS, DIAN y el CTI de Fiscalía; e instituciones de carácter privado como: Sociedad de Mejoras Públicas, Zoológico Santa Fe, Fundación UNAU, Fundación ECOSANTAFE y Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, entre otros.

Por otra parte Corantioquia hace parte de la denominada Zona Noroccidental figura de coordinación liderada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, de la cual hacen también parte: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CAR, CARDER, CODECHOCÓ, CORNARE, CORPOCALDAS, CORPOURABÁ, CORTOLIMA, CRQ, CVC, y CVS. Esta figura de coordinación ha servido para realizar acciones conjuntas de control, unificar piezas y metodologías de sensibilización y hacer más eficiente y efectivo las actividades de control y seguimiento al tráfico ilegal de fauna y flora en el centro occidente del país.

Una de las actividades que más repercusión ha tenido en el control al tráfico ilegal ha sido la implementación de la LÍNEA VERDE gratuita (018000414123), mecanismo de denuncia telefónica, en la cual Corantioquia aporta los equipos y la línea telefónica, ésta opera las 24 horas en la base de comunicaciones de la Policía Antioquia (Medellín), su objetivo principal es el de recoger y direccionar las inquietudes y denuncias de la ciudadanía referentes al comercio y tenencia de fauna silvestre.

Las acciones de control están basadas en las líneas y actividades definidas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres del MAVDT. Por lo anterior se realizan las siguientes acciones en conjunto con las

instituciones con funciones de policía:

Puestos de Control Ambiental (PCA): Este es un ejercicio que se realiza sobre las vías públicas, terminales de transporte o fluviales, conjuntamente con los miembros de la Policía o Ejército de Colombia. El PCA tiene como valor agregado el registro del conductor y vehículo mediante una ficha especialmente diseñada para ello, y la señalización de la actividad mediante pancartas diseñadas también exclusivamente para apoyar visualmente esta actividad. Se implementan generalmente en lugares identificados por estas instituciones; sin embargo, se han definido algunos lugares claves sobre carreteras en donde se realizan de forma más frecuente, en la medida que es por allí por donde se mueven mayor con frecuencia animales silvestres o sus productos, estos sitios son: Caucasia, Santa Rosa, La Pintada, Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío y Cisneros, cabe anotar que los PCA se pueden implementar de manera temporal o permanente en diferentes lugares del territorio.

Operativos de Revista: Son actividades que se realizan en plazas de mercado (formales e informales), atrios, plazas principales y otros sitios utilizados por los traficantes, para comercializar los productos de fauna y flora silvestre, estas actividades se realizan generalmente en compañía de funcionarios de instituciones con función de policía, los funcionarios de Corantioquia sirven de apoyo en caso de que se requiera de la identificación o manipulación de los ejemplares o productos.

Operativos de Allanamiento y Registro: Esta actividad sólo aplica en caso de que se tenga que ingresar a propiedad privada, en algunas ocasiones es motivado por Corantioquia pero debe ser solicitado por la Policía Judicial (Fiscalía, CTI, DAS o DIJIN), se realiza por orden de un juez y lo efectúan funcionarios de Policía Judicial y Policía ordinaria.

Existe un protocolo que Corantioquia validó con la Fiscalía General de la Nación, éste parte del hecho las acciones educativas que se le han realizado a los tenedores de fauna para que la entreguen de manera voluntaria, para lo cual se les motiva o realiza visita personal, con el fin de explicar las consecuencias biológicas y legales de la tenencia de fauna silvestre, así como los procedimientos que se llevan con los animales rescatados, de no ser suficientes estas acciones, se procede diligenciar un Acta de Tenencia de Fauna Silvestre, formato diseñado especialmente para estos casos y se convierte en la primera evidencia del contacto pedagógico que se hace y copia del mismo deberá ser remitido con la motivación a la Policía judicial.

Como producto de los ejercicios de sensibilización sobre el no uso de fauna silvestre como mascota, existe cada vez más conciencia ecológica de la ciudadanía y altos niveles de credibilidad en Corantioquia y las otras instituciones miembros del CIFFA.

Entre los años 1995 y 2009 Corantioquia ha recibido 30.116 individuos de la fauna silvestre (ver tabla 9), producto de entregas voluntarias, incautaciones realizadas por funcionarios de las autoridades con función de policía y rescates propiamente dichos.

5.3 TRATAMIENTO Y MANEJO DE ESPECIES POST DECOMISO

Cuando se rescata un animal de la fauna silvestre colombiana, entra en un proceso complejo, que con suerte termina en el regreso de éste a un ambiente similar al de su origen, o por lo menos a condiciones de vida comparativamente más dignas a las

que tenía en manos de los comerciantes o particulares. En este proceso se requiere el trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales especializados en rehabilitación de fauna silvestre.

Infelizmente muchos de los animales que son recuperados en acciones de decomiso o son devueltos de forma voluntaria, llegan con limitaciones tanto físicas (mutilaciones, afecciones de la piel, escamas o mucosas, atrofas musculares, deformaciones esqueléticas), así como de comportamiento, entre las cuales el amansamiento es la más grave, pues no sólo el animal reconoce al ser humano como su guardián y alimentador, sino que en la mayoría de los casos han perdido el instinto de sobrevivir en condiciones naturales, olvidándose incluso de reconocer sus congéneres y a los enemigos y los alimentos que ingieren los individuos de su misma especie en condiciones naturales.

Por estas razones existen una serie de hospitales especializados para este tipo de fauna, ubicados estratégicamente en lugares cercanos a donde se implementan los PCA de manera más permanente.

Los lugares en Antioquia donde existen estos centros de atención son en nuestra jurisdicción: Puerto Berrío, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa, Hispania y Caucasia; Guarne (Jurisdicción de Cornare), Apartadó (Jurisdicción de Corpourabá) y Barbosa contiguo al parque de las aguas (Jurisdicción Área Metropolitana del Valle de Aburrá). Sin embargo existen otros tantos en todo el territorio nacional, incluyendo los programas especiales que también cuentan con infraestructura de evaluación y tratamiento como la Fundación UNAU, Fundación ECOSANTAFE entre otros.

Una vez los animales pasan por el periodo de tratamiento, la Autoridad Ambiental define su destino según los protocolos de evaluación y destino final publicado por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y que dependen de factores como estado sanitario, físico y psicológico, conocimiento de la distribución natural, entre otros.

Cuando ingresan a la red de tratamiento individuos de cuyas especies existan programas especiales en el país se hacen los contactos pertinentes para remitirlos a estos programas, para mencionar algunos están titi gris, venados, perezosos, mono aullador, paujil, programas que son por lo general operados por organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales están la fundación UNAU quienes están especializados en perezosos, hormigueros y armadillos o la fundación ECOSANTAFE con el mono Aullador rojo, paujil de pico azul y la guacamaya verdelimon.

Cuando se define que la opción mejor de conservación es la liberación de los animales, estos podrían ser liberados en sus ecosistemas naturales, si sus condiciones comportamentales son adecuadas y el ecosistema le permite altas posibilidades de

AÑO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Subtotal
Aves	302	145	336	570	481	1189	269	318	1241	222	556	451	1389	1070	1190	9729
Mamíferos	125	112	54	90	158	220	98	114	508	132	145	80	197	349	334	2716
Reptiles	139	34	9	230	507	1516	613	245	1352	2118	4510	2870	1173	1155	1200	17671
Subtotal	566	291	399	890	1146	2925	980	677	3101	2472	5211	3401	2759	2574	2724	30116

TABLA 8. Resumen de animales recibidos por CORANTIOQUIA entre los años 1995 y 2009.

sobrevivencia, lo que se conoce como liberación dura o por el contrario son inducidos al proceso conocido como liberación blanda, éste se realiza con los animales que presentan algún cambio en su comportamiento silvestre, como por ejemplo algún nivel de amansamiento, donde los animales requieren de algún tiempo de adaptación y aclimatación en las plataformas de reubicación que son lugares generalmente pertenecientes a la sociedad civil en donde se han construido jaulas de aclimatación y en otros casos son sólo ecosistemas en los cuales las amenazas antrópicas inmediatas son reducidas, allí se llevan los animales acompañados del Salvoconducto Único de Movilización, un formato de orden nacional que ampara la movilización de individuos y productos de la fauna y flora silvestre.

Las jaulas de aclimatación (con dimensiones mínimas de 3x3x3 m) son encierros donde los animales pasan el tiempo suficiente para acoplarse visual y fisiológicamente a las nuevas condiciones de vida (este tiempo puede oscilar entre 8 y 150 días, según la especie y las condiciones del animal en particular). Posteriormente, pasado el período de aclimatación, se inducen a ampliar su área de acción abriéndoles las puertas y ofreciéndoles alimento afuera de la jaula y condiciones ambientales y seguras en el espacio inmediato a la jaula, lo que con suerte induce a los animales a recuperar sus capacidades motoras y de adaptación a las nuevas condiciones.

Este proceso permite involucrar de forma activa a la comunidad y sirve como una herramienta educativa sobre la protección de la fauna silvestre y la necesidad de conservarla en ambientes naturales. Es así como consideraciones de tipo sanitario, de comportamiento, de distribución natural, ambiental, social y de potencial educativo, son tenidas en cuenta al implementar este tipo de programas.

Para poder realizar de manera efectiva los procesos de liberación blanda, Corantioquia implementó la figura de Reubicador de Fauna Silvestre, creada por la resolución N°. 3208 de febrero 18 de 2000, la cual permite involucrar de forma activa a la comunidad en este interesante proceso mediante la construcción y mantenimiento de las jaulas de aclimatación en sus predios particulares.

Otro aspecto importante desarrollado por los funcionarios de Corantioquia hace referencia a las quejas o información que se recibe, sobre conflictos ocasionados por los animales silvestres, debido en su mayoría a las alteraciones a que están siendo sometidos los hábitat naturales y a las presiones sobre las poblaciones naturales que sirven de alimento a predadores o a ellos mismos, lo que esta ocasionando que algunos individuos encuentren en los animales domésticos una fuente fácil y abundante de proteína, o para el caso de los herbívoros los productos de cosechas como maíz, yuca y frutas que se convierten en un manjar que satisface sus necesidades.

Los felinos, osos andinos y otros animales como zorros, murciélagos, zariguellas y garzas del ganado son algunos de los animales que más conflicto ocasionan; sin embargo los grandes y medianos roedores, los murciélagos e inclusive algunas aves como loros, pericos y guacamayas, los réptiles como babillas e iguanas, son también causantes de esta problemática.

5.4 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Corantioquia le ha apostado a los procesos de educación como uno de los pilares del ejercicio de la autoridad ambiental, somos conscientes que parte de la solución está basada en mejorar la aproximación ética del habitante de su jurisdicción al uso de la fauna silvestre y es precisamente este componente tan carismático de la biodiversidad en donde los efectos de esta actividad se ven mejor reflejados, cada vez son más las personas sensibles con el derecho a la libertad que tienen los animales silvestres y las razones por las cuales no es debido mantenerlos en cautiverio o exterminarlos, son cada vez más frecuentes las denuncias sobre tráfico ilegal, las entregas voluntarias de animales y los proyectos educativos que involucran la conservación de la fauna silvestre o sus hábitat como parte de sus objetivos.

Se han realizado esfuerzos para dar a conocer la fauna existente en la jurisdicción, sus funciones y la importancia de conservarla en sus ambientes naturales, por otra parte se han implementado acciones con el fin de motivar de manera amigable a los ciudadanos para que entreguen a la Autoridad Ambiental o a la Policía los animales que tienen en cautiverio para esto se desarrollan talleres, charlas, videos, programas de televisión y radio que con el apoyo de una serie de piezas comunicativas que incluyen: videos, cartillas, manuales, pendones, afiches, postales, juegos, adhesivos, volantes entre otros, y la idoneidad y compromiso de los funcionarios han permitido alcanzar estos objetivos.

Las capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios con función de policía, se han convertido en actividades fundamentales para lograr resultados efectivos en contra del tráfico ilegal. Para lo cual se tienen definido esquemas de capacitación que se repiten dos veces al año a los miembros de la Policía que están en los comandos municipales y así mismo, se realiza esta actividad con miembros del ejército, el DAS y la Fiscalía.

Corantioquia realizó entre los años 2002 y 2004 el censo de fauna silvestre en cautiverio en 70 cabeceras municipales de la jurisdicción, lo que permitió registrar 7.816 animales bajo esta condición, esta información sirvió también para conocer aspectos relacionados con la adquisición y tenencia de los mismos, y ha sido precisamente la que ha permitido de manera gradual la recuperación de gran parte de ellos y ha motivado la implementación de estrategias como Municipio Libre de Fauna Silvestre, con grandes avances en varios de ellos como Anzá, Liborina, Jericó, Támesis, Cáceres, Hispania, Jardín, Vegachi, Yolombo, Amalfi, Cisneros, Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entreríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Toledo, Yarumal y Jardín y las declaratorias de Ciudad Bolívar y Caicedo.

Los resultados hasta ahora obtenidos, nos han permitido afirmar que se ha producido una reducción considerable en la tenencia de fauna silvestre en los hogares de nuestra jurisdicción y se espera continuar con estas acciones para que finalmente poder declarar libre de fauna silvestre en cautiverio la jurisdicción de Corantioquia.



Algunas especies
de importancia

Tan solo por existir deberíamos ser importantes, por aportar a la vida reconocidos, por cumplir con el plan tenidos en cuenta y por transmutar recordados.

6. ALGUNAS ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y/O ECONÓMICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Mediante estudios específicos puntuales e investigaciones sistemáticas, Corantioquia ha realizado esfuerzos económicos y logísticos con el fin de diseñar o implementar estrategias de conservación con algunas de las especies consideradas de importancia ecológica por la función que desempeñan en los ecosistemas que habitan o por ser especies carismáticas o de las cuales se hace uso frecuente por las comunidades con el fin de acceder a los individuos o sus productos.

En este capítulo se presentan 14 especies con el fin de compartir parte de estos esfuerzos y mejorar el conocimiento de ellas.

6.1 OSO ANDINO

Nombre científico:

Tremarctos ornatus

Nombres comunes:

Oso, oso negro, oso de anteojos, oso careto, oso congo, oso frontino, oso enjaquimado, oso real, oso piñuelero.

Historia natural:

Es un animal pacífico y tímido, aunque huye a la presencia humana cuando se siente acorralado se vuelve agresivo. De comportamiento solitario, con hábito mayormente nocturno, sus “pies planos” les facilitan una postura erecta que utiliza tanto para divisar el panorama como para trepar árboles y rocas o para aparentar mayor masa cuando requiere amedrentar a sus oponentes o enemigos. Vive 30 años en cautiverio y 50 en el bosque. Es principalmente vegetariano, sin embargo maneja variedad en sus hábitos alimenticios, consumiendo brotes tiernos de chusque, bromelias, cortezas de algunos árboles, cogollos y pecíolos de palmas; de igual manera en su dieta puede incluir larvas de cucarrones, abejas, anélidos, además de pequeños roedores y mamíferos.

La madurez sexual de la hembra ocurre entre los 4 y 7 años de edad, el periodo de celo dura entre 1 y 2 semanas, generalmente entre los meses de noviembre y febrero, durante este tiempo se pueden realizar hasta treinta cópulas en un lapso de cinco días. El proceso de gestación dura entre 7 y 8 meses y la hembra puede dar a luz hasta 4 oseznos, aunque comúnmente son 2, los cuales nacen sin dientes y ciegos, abren sus

ojos antes de los 3 meses de edad. Los oseznos permanecen con su madre más de un año, luego inician su vida solitaria.

La importancia ecológica del oso andino radica en su papel como dispersor de semillas, aunque también puede ser un importante transformador del bosque al derribar arbustos y ramas para alimentarse, posibilitando los mecanismos de renovación del bosque, afectando directamente procesos sucesionales dentro del mismo (Rodríguez et al. 1998).

Hábitat:

Zonas bajas, húmedas, montañosas, boscosas densas; bosques primarios y secundarios bien conservados; en bosques ribereños, bosques submontanos, montanos y altimontanos. Desde los 500 hasta los 4.000 msnm.

Distribución:



En Suramérica: Venezuela hasta el norte de Argentina. Colombia: en los Andes colombianos: Antioquia, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima. Antioquia: en la Cordillera Occidental y Central. En la jurisdicción de Corantioquia en las Direcciones Territoriales de Cartama, Citará, Tahamíes y Zenufaná, municipios de Anorí, Amalfi, Ituango, Caicedo, Jericó, Támesis, Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Ebéjico.

Situación actual y categoría de amenaza:

Peyton (1980), señala que las poblaciones de oso andino en toda Suramérica son de al menos 18.250 ejemplares, de los cuales entre 4.000 y 5.000 se encuentran actualmente en Colombia. La principal amenaza que enfrenta el oso andino es la degradación y pérdida del hábitat. Esto a raíz de la expansión agrícola, los cultivos de uso ilícito y la colonización de las vertientes pertenecientes al sistema montañoso andino. De igual manera las creencias populares sobre supuestas propiedades medicinales de partes del oso andino o uso ritual, también conducen a la cacería indiscriminada de esta especie. Esta categorizado a nivel nacional como Vulnerable: VU

Avances en su conocimiento y conservación:

Esta especie es frecuentemente reportada por pobladores de áreas en su distribución natural, principalmente en los municipios de Caicedo, Jardín, Andes, Betania, Concordia, Ciudad Bolívar y Amalfi, entre otros, quienes los han observado cruzando caminos o consumiendo frutales y maíz, muchas veces cercanos a las viviendas. En el año 2002 Corantioquia, realizó el inventario y caracterización genética de las poblaciones de oso andino en las Cordilleras Central y Occidental. Actividad que hace parte del Programa Nacional para la Conservación del oso andino promulgada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.



Mapa de distribución e imagen del
Tremarctos ornatus en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA

6.2 JAGUAR

Nombre científico:

Panthera onca

Nombres comunes:

Jaguar, tigre mariposo, tigre real, manodelana

Historia Natural:

Hábitos nocturnos y diurnos, terrestres y solitarios. Vive en zonas boscosas poco perturbadas cerca de fuentes de agua. Descansa en la vegetación densa, guaridas, troncos, árboles caídos y matorrales densos. Se desplaza por corredores naturales o artificiales, márgenes de caños y ríos. Dieta carnívora, se alimenta de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces considerándose controlador biológico de sus poblaciones, por lo que se convierte en un buen indicador de la condición de un bosque, ya que su presencia significa que las especies más bajas en la cadena trófica están bien representadas.

El macho ocupa áreas superpuestas con 1-3 hembras, requiere áreas grandes de extensión de 10-105 km. El sonido son rugidos ronc, profundos y resonantes. El promedio de vida es de 20 años. La hembra y el macho alcanzan la madurez sexual a los 2 años. La gestación dura 100 días; la hembra pare de 1-4 crías por camada que se independizan a los 2 años.

Hábitat:

En zonas bajas, húmedas y montañosas; bosques húmedos, deciduos, semideciduos. En zonas boscosas densas; bosques primarios y secundarios; en bosques ribereños; bosques submontanos y montanos; Desde los 0 hasta los 3200 msnm.

Distribución Geográfica:

Norte, Centro y Suramérica: desde México hasta Argentina. Colombia: en las regiones Norte, Centro, Occidente, Oriente y Sur: Amazonia, Orinoquia, Bolívar, Chocó, Costa Atlántica, Magdalena, Santander, Caquetá, Casanare, Guainía, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada. Antioquia: Anorí, El Bagre, Ituango, Murindó, Nechí, Segovia, Urrao, Zaragoza.

Situación actual y categoría de amenaza:



Especie vulnerable “VU”. Se encuentra en peligro ya que se caza por considerarla perjudicial para el ganado vacuno. La mayoría de las poblaciones han disminuido a causa de la caza por su piel y la destrucción del hábitat. En muchas zonas la especie está diezmada.

Avances en su conocimiento y conservación:

El Programa Nacional para La Conservación de los Felinos en Colombia (MAVDT 2007) tiene como misión promover la conservación de las diferentes especies de félidos en Colombia estableciendo una estrategia que vincule y comprometa a las entidades, comunidades, grupos y personas a nivel regional y local dentro de los planes de manejo y conservación, que permita implementar los lineamientos generales, así como la formulación, desarrollo y articulación de líneas de acción.

Debido a los frecuentes conflictos que ocasiona en su área de distribución con el gremio ganadero y a que es considerado por Corantioquia como especie de gran im-

portancia; en el 2005 se contrato con Víctor H. Quiroz el Estudio de la Situación de Depredación de Ganado por Felinos Silvestres en la Jurisdicción, y en el 2009 con Andrés Arias la Aproximación al Estado de Conservación de las Especies de Felinos en Algunos Municipios Pertenecientes a las Cuencas Aportantes del Sector Eléctrico en Jurisdicción, evidenciaron la problemática a la que están enfrentados los felinos en cuanto a la presión ejercida mediante la expansión de frontera agrícola, fragmentación de hábitad, disminución de fuentes de alimento por caza furtiva y la misma cacería deportiva contra el jaguar como trofeo, además también generó un análisis espacial de la problemática actual con los felinos especialmente el jaguar y el puma.



Mapa de distribución e imagen del *Panthera onca* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.3 DANTA COMÚN

Nombre científico:

Tapirus terrestris colombianus

Nombres comunes:

Tapir, danta, sachavaca, danta revolcadora.

Historia natural:

Nocturna y en ocasiones diurna, terrestre y solitaria, folívoro, se alimenta de vegetales y frutos. Usa lamederos de sal junto con venados y pecaríes. Vive en zonas boscosas densas y secundarias, cerca de cuerpos de agua como ríos y pantanos. A pesar de ser solitaria, algunos individuos usan la misma área; tiene caminos bien demarcados que utiliza con frecuencia para moverse de un lado a otro. Es tímida, silenciosa y raramente se le ve, descansa o duerme en el agua o en la vegetación densa y espesa, especialmente en pantanos, generalmente defeca en el agua. Cuando está asustada corre entre la maleza en dirección a un curso de agua.

Emite silbidos o gruñidos. El promedio de vida es de 30-35 años; la gestación dura aproximadamente 13 meses; la hembra pare 1 cría por camada, la cual es amamantada por año y medio; alcanza la madurez sexual a los 4-5 años. Es dispersora de semillas de los frutos que consume. Al defecar en el agua, suministra alimento a larvas y alevinos de peces.

Hábitat:

En zonas bajas, secas, húmedas, templadas y frías. En bosques primarios y secundarios bien conservados, bosques secos, deciduos y semideciduos, en bosques ribereños; bosques siempre verdes, bosques submontanos y pastizales con agua y vegetación densa; desde los 0 hasta los 2400 msnm.

Distribución:



Suramérica: desde el norte de Colombia al sur de Brasil y norte de Argentina y Paraguay. Colombia: en las regiones Caribe, Amazonía, Orinoquía, valles de los ríos Cauca y Magdalena. En la jurisdicción de Corantioquia en las Direcciones Territoriales: Panzenú, Tahamíes y Zenufaná en los municipios de Amalfi, Anorí, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Cáceres, Puerto Berrío y Zaragoza.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Su principal amenaza es la cacería y la pérdida de su hábitat, que ha llevado a la especie a la extinción en muchas localidades, para *Tapirus t. colombianus*, gran parte de su distribución original en la planicie de la región Caribe y valles interandinos se ha perdido. Actualmente la subespecie *Tapirus t. columbianus* tiene unas pocas poblaciones en la región Caribe que podrían estar en peligro crítico en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Cesar y Guajira. Esta categorizado a nivel nacional en Peligro Crítico (CR).

Avances en su conocimiento y conservación:

En el año 2004 Corantioquia realizó la búsqueda de poblaciones y algunos aspectos de la utilización de hábitat de la Danta colombiana (*Tapirus terrestris colombianus*), en el Nordeste antioqueño, éste se enmarcó dentro de las actividades del Programa Nacional para la Conservación del Género Tapirus en Colombia promulgada por el MAVDT.



Mapa de distribución e imagen del *Tapirus terrestris* colombiano en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.4 MANATÍ

Nombre científico:

Trichechus manatus

Nombres comunes:

Vaca marina, manatí del Caribe, manatí de las Antillas.

Historia natural:

Los manatíes no son territoriales ni agresivos, son herbívoros, se alimentan fundamentalmente de plantas acuáticas; pueden consumir del 8 al 10% de su peso en vegetación cada día. No es una especie reconocida como grupal, ocasionalmente se observan agrupaciones de individuos en actividades de alimentación, descanso, desplazamiento y reproducción que pueden durar minutos o incluso algunos días. Se caracterizan por tener una tasa de reproducción lenta, las hembras maduran sexualmente después de los 4 años y los machos a los 5 o más. El período de gestación es de aproximadamente 13 meses y el tiempo de lactancia se extiende al menos por 2 años.

Hábitat:

Aguas costeras, estuarinas y dulces del trópico y subtrópico, entre ellos: ríos, lagunas, ciénagas, planicies inundables.

Distribución:

Costas de México, islas del Caribe, ríos y la zona costera oriental de Centroamérica hasta el noreste de Brasil. Cuencas del Caribe, el Orinoco (reportada para los ríos Meta, Casanare y Orinoco) y parte del río Magdalena, en donde su distribución actual cubre desde Puerto Berrío (Antioquia) hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza y el Canal del Dique.


También está presente en sistemas de ciénaga asociados al río como la de Paredes en Santander y al sur de Bolívar. Sobre esta especie se han realizado reportes en la costa de Santa Marta, Bahía Taganga, frente a Barranquilla, en los ríos Cesar, Fundación, Frío, Sevilla y el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca, igualmente en numerosas ciénagas de la región y en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Atrato. En el Orinoco, existen reportes para los ríos Meta, Casanare y Orinoco. Antioquia: Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare, Caucasia, Nechí, Turbo y Necoclí. CORANTIOQUIA: En las Direcciones Territoriales de: Panzenú y Zenufaná

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Se considera que en Colombia la especie ha venido disminuyendo rápidamente de su área original de distribución, principalmente debido a la caza. Algunos animales quedan atrapados en ciénagas que son desecadas, también se presentan casos de mortalidad en mallas, especialmente de crías y juveniles, muertes por accidentes producidos por las embarcaciones. Esta categorizado a nivel nacional En Peligro: EN

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha realizado el seguimiento y caracterización de población de manatíes presentes en la Ciénaga El Totumo, municipio de Yondó en el año 2002 y en el 2003, la caracterización poblacional, uso y mejoramiento ambiental de hábitat del manatí en el mismo cuerpo de agua, lo que ha generado en las comunidades de la necesidad de proteger y conservar esta especie. Las acciones realizadas se respaldaron en el Programa Nacional de manejo y Conservación de manatíes en Colombia promulgada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.



Mapa de distribución e imagen del
Trichechus manatus en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA

6.5 NUTRIA

Nombre científico:

Lontra longicaudis

Otros nombres comunes:

Perro de agua, lobito de río.

Historia natural:

Diurna y nocturna, semiacuática, solitaria o en parejas, se alimenta principalmente de peces, crustáceos y otros invertebrados acuáticos. Vive en zonas poco perturbadas cerca de fuentes de agua, márgenes de ríos y caños, prefiere corrientes rápidas, es buena nadadora y buceadora, está siempre en o cerca del agua. Cuando se desplaza en tierra lo hace de manera torpe con la cabeza y la cola bajas y la espalda jorobada alta. Se refugia en madrigueras que hacen en los bancos y orillas. Se desplaza por corredores naturales o artificiales de márgenes de caños y ríos. Produce sonidos similares a ladridos cuando juega en las orillas.

La gestación dura 63 días; la hembra pare de 2-3 crías por camada, las crías abren los ojos a las 4-5 semanas; a los 2-3 años se les considera adultos. Esta especie actúa como controlador biológico de peces, crustáceos y moluscos; se convierte en una buena indicadora de la calidad de las aguas.

Hábitat:

Zonas bajas, húmedas, templadas y frías, aparentemente prefiere hábitat poco intervenidos en bosques y áreas de sabana, en donde selecciona ríos y arroyos de curso rápido y aguas claras, aunque se han observado igualmente en ríos grandes con alta carga de sedimento (Emmons, 1999). También su presencia se ha reportado en quebradas, ciénagas, caños, lagos, lagunas y áreas costeras; desde los 0 hasta los 2.800 msnm.

Distribución:

Desde el norte de México hasta Uruguay. Colombia: en las regiones Norte, Centro, Occidente, Oriente y Sur: Bolívar, Caldas, Chocó, Costa Atlántica, Magdalena, Santander, Caquetá, Casanare, Guainía, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada. Antioquia: Cauca, Yondó, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Puerto Berrío, Segovia, Puerto Nare, Remedios Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Salgar, Maceo, Jericó, Belmira, Cisneros, Nechí, Argelia, Frontino, Granada, Ituango, Puerto Triunfo, San Luis, San Carlos, San Rafael, Sonsón, Urrao, Yolombó. CORANTIOQUIA: Cartama, Citará, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:


Se considera que la especie en Colombia ha venido desapareciendo rápidamente de gran parte de las cuencas hidrográficas del país, no sólo por la cacería intensiva para comercializar sus pieles, sino también por la pérdida de la oferta alimenticia como resultado de la contaminación del agua. Esta especie es particularmente susceptible a la degradación del hábitat, contaminación de agua y sobrepesca. Esta categorizada a nivel nacional como Vulnerable (VU).

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha realizado los siguientes estudios: Uso de microhábitat y dietas de la Nutria neotropical, en el cañón del río Alicante, Situación y distribución de la Nutria neotropical en la cuenca del río San Juan, así como la aproximación a la existencia

de la nutria neotropical su afectación y grados de amenazas en la territorial Panzenú, Bajo Cauca Antioqueño.

Por otro lado, para esta especie tan susceptible al tráfico ilegal, en donde se han adelantado campañas específicas sobre el control al uso de sus pieles en artículos de peletería principalmente en los municipios del Suroeste Antioqueño, como también el rescate, tratamiento y manejo de algunos individuos.



Mapa de distribución e imagen del *Lontra longicaudis* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.6 CHIGUIRO

Nombre científico:

Hydrochaeris hydrochaeris

Otros nombres comunes:

Lancho, ponche, yulo, capibara, carpincho.

Historia natural:

Diurno, pero crepuscular y hasta nocturno en zonas donde son intensamente cazados, terrestre y semiacuático, en grupos familiares de 2-6 individuos. Se alimenta de pasto (tanto terrestres como vegetación acuática) frutos, flores, hojas y corteza, vive en pastizales cerca de cuerpos de agua; forma grandes manadas en sabanas inundables y grupos más reducidos en zonas boscosas. Se refugia en pastizales. Emite aullidos, gruñidos, gorjeos. Cuando se asusta se zambulle en el agua para escapar. Su área de acción es de 10 a 200 Ha. Copula en el agua. En la época reproductiva los machos establecen territorios y los marcan con esencias que secreta de las glándulas nasales y anales. El periodo de gestación oscila entre 104 a 126 días; la hembra pare de 3-8 crías por camada. Controla las plantas acuáticas y la vegetación herbácea en las márgenes de los ríos.

Hábitat:

Zonas húmedas y cálidas a lo largo de ríos y ciénagas. En praderas, bosques maduros y de crecimiento secundario, bosques ribereños; bosques secos y semidecíduos; desde los 0 hasta los 900 msnm.

Distribución:

Centro y Suramérica: Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador hasta el norte de Argentina. Colombia: En las regiones Caribe, Amazonía y Orinoquía: Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Cauca, Chocó, Córdoba, Costa Atlántica, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Vichada. Antioquia: Caucasia, El Bagre, Nechí, Puerto Berrío, Puerto Triunfo (Puerto Perales), Región de Urabá, valle medio del Magdalena, Yondó, Zaragoza. CORANTIOQUIA: Tahamíes, Panzenú y Zenufaná.


Situación actual y categoría de amenaza nacional:

No está contemplado en ninguna categoría de amenaza, sin embargo, en regiones donde hace relativamente pocos años era común ahora es considerado poco común, debido principalmente a la cacería para consumir su carne, lo que se acrecienta en época de Semana Santa.

Avances en su conocimiento y conservación:

Esta considerada dentro de las especies que son sometidas al tráfico ilegal en la jurisdicción. En el año 2004 se realizó un proyecto en el Bajo Cauca antioqueño cuyo objetivo fue implementar un modelo de aprovechamiento sostenible del ponche en el cual, se contempló la reintroducción de aproximadamente 200 individuos en algunas ciénagas de la región el cual se acompañó de talleres con las comunidades vecinas a estos humedales buscando un aprovechamiento sostenible de estas poblaciones, pero por factores principalmente de orden público no se pudo continuar.

Dentro de los procedimientos de control al tráfico, se han incautado tanto carne como individuos vivos, que son sometidos a los protocolos de tratamiento y manejo estipulados por Corantioquia.



Mapa de distribución e imagen del *Hydrochaeris hydrochaeris* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.7 MONO AULLADOR ROJO

Nombre científico:

Alouatta seniculus

Otros nombres comunes:

Aullador colorado, mono cotudo.

Historia natural:

Diurno, arborícola, gregario. Consume hojas y frutos. Vive en grupos familiares de 2-9 individuos, conformados por: 1-2 machos adultos, 2-3 hembras adultas, varios juveniles y crías. Usa los niveles medios y altos del bosque; su área de acción es pequeña. En la noche duerme en árboles grandes emergentes en las copas o ramas. Cuando está asustado defeca y orina al intruso que esté debajo. En la época seca puede bajar al suelo al borde de un río para beber o comer tierra; usa salitres para lamer. Emiten sonidos de coros fuertes de rugidos y aullidos. Su área de acción es de 4 a 60 Ha.

Los nacimientos se dan en cualquier mes del año; la gestación dura 191 días, pare una cría, ésta es transportada por la madre vientre-ventre, a las 6-8 semanas son transportados en el dorso ya que su cola es funcional, a los dos meses empiezan a ingerir alimentos sólidos, pero siguen siendo amamantados hasta el décimo mes. El macho más viejo es el único que se aparea, los machos alcanzan la madurez sexual a los 58-66 meses y las hembras en 43-54 meses. Machos y hembras sin rango se dispersan del grupo natal para unirse a otros grupos. Es buen dispersor de semillas y contribuye de forma muy directa en el ciclo de nutrientes y en la regeneración del bosque.

Hábitat:

Bosques primarios y secundarios; en bosques de galería, caducifolios y subxerofíticos, bosques de palmas. Desde los 0 hasta los 1.600 msnm.

Distribución:


Suramérica: Venezuela, Trinidad, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Colombia: en la mayor parte del país: En las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía. Antioquia: Heliconia, La Pintada, Jericó, Maceo, Yondó, Remedios, Segovia, Cáceres, Tarazá, Anorí, Amalfi, Ituango. CORANTIOQUIA: Cartama, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Esta especie no está contemplada en ninguna categoría de amenaza, sin embargo, en regiones donde hace relativamente pocos años era común ahora es considerado de poco común a rara, debido principalmente a la cacería a que es sometido para consumir su carne o para el comercio de juveniles como animal mascota. Es muy sensible a la pérdida de coberturas arbóreas de las que es altamente dependiente.

Avances en su conocimiento y conservación:

Esta especie es considerada como carismática, por los sentimientos de ternura que despierta su fenotipo, razón por la cual es común que sea rescatado del tráfico ilegal, principalmente por entregas voluntarias e incautaciones. Corantioquia ha apoyado las iniciativas que adelantan inicialmente la Fundación Ecolombia y en la actualidad la Fundación Ecosantafe, con el fin de hacer tratamiento y rehabilitación de individuos rescatados, acciones que se realizan principalmente en el Centro de Rehabilitación ubicado en el municipio de Jericó.



Mapa de distribución e imagen *Alouatta seniculus* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.8 Perezoso de tres dedos

Nombre científico:

Bradypus variegatus

Otros nombres comunes:

Perico ligero, oso perezoso, perico de pelo, perezoso.

Historia natural:

Diurno y nocturno, arborícola y solitario. Se alimenta de hojas, frutos y retoños de varias plantas, en especial de Yarumo (*Cecropia spp.*). Está asociado a bosques tanto de zonas bajas como altas. Vive guindado de las ramas de los árboles, en el dosel medio y alto. No usa refugios, duerme enrollado en sitios enmarañados. Desciende muy poco del árbol donde se alimenta casi sólo para defecar y orinar. Son buenos nadadores. Emiten silbidos agudos. La temperatura corporal oscila entre 24 y 33°C.

En ocasiones mueren electrocutados al pasar de un árbol a otro por cables eléctricos y son frecuentemente atropellados por los vehículos. Se aparea principalmente en la época seca, la gestación dura entre 5-6 meses, pare una sola cría, ésta se sube al pecho de la madre, la cría es amamantada y transportada en el pecho; pasadas algunas semanas el pequeño empieza a comer hojas y a desplazarse por las ramas sin alejarse de la madre; los machos y hembras alcanzan la madurez sexual a los 3 años de edad; el promedio de vida es de 20 a 30 años. En algunos ecosistemas constituye un gran porcentaje de la biomasa del bosque, su dieta fitófaga contribuye de forma muy directa en el ciclo de nutrientes y en la regeneración del bosque.

Hábitat:

Bosque semideciduo, bosque siempre verde, bosque seco, bosque submontano, bosque montano, bosque altimontano; en bosques primarios y secundarios, generalmente por debajo de los 2.500 msnm.

Distribución:

Centro y Suramérica, desde Honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia hasta el norte de Argentina. Colombia: en todo el país. Antioquia: en todo su territorio. CORANTIOQUIA: En todos los municipios de la jurisdicción.


Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Esta especie no está contemplada en ninguna categoría de amenaza, sin embargo sus poblaciones pueden estar siendo diezmadas considerablemente debido principalmente a la cacería a que es sometido para el comercio como animal mascota, en especial los juveniles y subadultos. Es muy sensible a la pérdida de coberturas arbóreas de las que es altamente dependiente.

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha participado desde el año 1998, en los ejercicios que sobre tratamiento, rehabilitación y reintroducción que realiza la Fundación UNAU, cuyo centro funciona en la finca La Luz del área rural del municipio de Caldas, Antioquia.

Conjuntamente con el MAVDT y otras Autoridades Ambientales, se apoyó el diseño e implementación de la Estrategia de Conservación de Perezosos en donde además se incluyen una serie de piezas educativas.



Mapa de distribución e imagen de
Bradypus variegatus en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA

6.9 TITÍ GRIS

Nombre científico:

Saguinus leucopus

Otros nombres comunes:

Tistís, tamarín de pies blancos, tamarín pardo plateado de cara pelada.

Historia natural:

Diurno, arborícola, monógamo, consume frutos, exudados, hojas, néctar, insectos, otros invertebrados y pequeños vertebrados. Convive en grupos familiares de hasta 15 individuos conformados por un macho y una hembra alfa, por machos y hembras adultos, subadultos, juveniles y crías. Usa todos los niveles del bosque, prefiere hábitat de bosque ribereño; son territoriales; cuando cazan insectos pasan buen tiempo escudando agujeros y ranuras en los troncos de los árboles. En la noche duerme en árboles grandes emergentes con lianas y sitios enmarañados. Emite sonidos como gorjeos y trinos similares al de las aves. El área de acción promedio es de 17,7 Ha.

Viven entre 10-15 años en libertad. La gestación dura entre 5 y 6 meses; pare 1-2 crías por parto; la cría es cargada a la espalda las primeras 6 - 8 semanas por alguno de sus padres u otros miembros del grupo. Una sola hembra del grupo es activa sexualmente en la misma temporada, inhibiendo el comportamiento reproductivo en las otras. Es un gran controlador de insectos y dispersor de semillas.

Hábitat:

Bosques primarios y secundarios bien conservados; en bosques de galería. Desde los 0 hasta los 1800 msnm.

Distribución Geográfica:


Colombia: Bolívar, Caldas y Tolima. Antioquia: entre los valles de los ríos Cauca y Magdalena. CORANTIOQUIA: Aburrá Norte, Aburrá Sur, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.

Situación Actual y Categoría de Amenaza Nacional:

Es una especie endémica para Colombia, tiene una de las distribuciones geográficas más pequeñas. Desafortunadamente es una especie utilizada como animal mascota, lo que hace que muchos individuos sean capturados y vendidos para este fin, que unido a la deforestación de su área de distribución, ha hecho que este categorizado a nivel nacional como Vulnerable (VU).

Avances en su conocimiento y conservación:

Esta especie requiere atención debido a la frecuencia con que son rescatados del tráfico ilegal. Coherentes con los ejercicios de conservación que se están realizando a nivel nacional, Corantioquia realizó en el año 2004 el estudio cuyo objetivo fue conocer la distribución histórica y actual, uso de hábitat y estimación del estado de conservación del tití gris en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA, así mismo en el 2006 se realizó el trabajo denominado puntos críticos de extracción y tráfico ilegal del tití gris en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA, actividades que hacen parte de la Estrategia de Conservación del titi gris liderada por el por el MAVDT.



Mapa de distribución e imagen de
Saguinus leucopus en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA

6.11 PAUJIL DE PICO AZUL

Nombre científico:

Crax alberti

Otros nombres comunes:

Pajuí, pajuil, pavón.

Historia Natural:

Es un ave tímida, forrajea principalmente en el suelo en donde se alimenta de frutos, lombrices, insectos, retoños tiernos de algunas plantas y semillas. Es territorial, forma parejas o familias hasta de 4 individuos. Se comunica mediante sonidos prolongados y repetitivos (silbido suave), especialmente antes de emprender el vuelo cuando es sorprendido del cual se deriva su nombre local “pajuí”. Pone dos huevos grandes de color blanco, los cuales son incubados por ambos progenitores.

Hábitat:

Bosque húmedo tropical y el piedemonte del norte de Colombia, hasta 1.200 msnm, pero es más común hasta 800 msnm. Se encuentra generalmente en el interior de bosques primarios poco intervenidos y ocasionalmente en bosques con muchos claros al interior, vegetación secundaria o en bordes de bosque (Cuervo et al 1999).

Distribución:

Especie endémica del norte de Colombia (Hilty y Brown 1986, Stiles 1998). La distribución histórica de esta ave incluía tierras bajas y piedemonte del valle medio del río Magdalena, desde Honda hasta la Serranía de San Lucas, Bajo Cauca, valle del río Nechí y parte alta de los ríos San Jorge y Sinú, Serranía de San Jacinto y vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los registros más recientes en Antioquia se tienen de los municipios: Anorí, Nechí, Remedios, Puerto Berrío, Maceo, Cáceres, Tarazá, Yondó, Segovia, Zaragoza (Cuervo et al. 1999b, Salaman 1999). Direcciones Territoriales: Panzenú y Zenufaná.



Situación actual y categoría de amenaza nacional:

La especie es altamente vulnerable a la fragmentación y la cacería por sus requerimientos de territorios muy grandes, distribución localizada y bajas tasas de reproducción.

Actualmente, se estima que sólo se encuentra en el 5% de su área de distribución original, extinta regionalmente en la mayor parte de esta área, por la destrucción de su hábitat y la fuerte cacería a que es sometido para el consumo de su carne. Está categorizado a nivel nacional como en Peligro Crítico (CR).

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha venido acompañando las iniciativas de conservación de esta especie tanto en estudios sobre la distribución autoecología, así como en conservación de hábitat y reproducción ex situ, este último con relación al programa que adelanta la fundación Ecosantafe en el Centro de Rehabilitación actualmente ubicado en el municipio de Jericó. Estas actividades están enmarcadas en el Plan de Acción para la Conservación del pajuil de pico azul y su ecosistema en Colombia, liderado por el MAVDT.



Mapa de distribución e imagen de *Crax alberti* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.12 GUACAMAYA VERDE

Nombre científico:

Ara militaris

Otros nombres comunes:

Guacamayo, guacamaya verde oscura.

Historia natural:

Estas guacamayas se agrupan en bandadas grandes muy ruidosas, se posan sobre árboles altos fructificados, son estacionales pero sus movimientos son poco conocidos. Así como otras guacamayas también se alimentan de frutos y semillas.

Hábitat:

Bosques secos, bosques abiertos y bosques ribereños. Aunque también se encuentra estacionalmente en selvas húmedas, desde el nivel del mar hasta 2000 msnm (Hilty y Brown, 1986).

Distribución:



Occidente de México hasta el noroccidente de Argentina (BirdLife international, 2000). En Colombia se distribuye en forma en el Valle del Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra de la Macarena, piedemonte de la Cordillera Oriental, sector norte del valle del río Cauca, y algunos sectores del piedemonte del Pacífico. Fue reportada por Hilty y Brown (1986) en el Valle de Aburrá donde ya desapareció y en el cañón seco del río Cauca, donde al parecer aún subsisten poblaciones pequeñas en los municipios de Liborina y Sabanalarga. También fue reportada por Serna (1980) en las estribaciones de la Serranía de San Lucas en el municipio de Remedios.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

La guacamaya verde está amenazada por la pérdida de hábitat, el tráfico y la cacería. El bosque seco es uno de los ecosistemas más deteriorados en Colombia. En el cañón del río Cauca quedan muy pocas áreas con hábitat óptimo para esta ave, además las poblaciones remanentes están sometidas a cacería, probablemente esta especie se extinga en un corto plazo en esta región. En numerosos trabajos de campo recientes en el Magdalena Medio, cuenca del río Nechí y Bajo Cauca, no se ha registrado esta guacamaya. Pueden existir poblaciones en el piedemonte occidental de la Serranía de San Lucas en el Nordeste antioqueño, teniendo en cuenta la extensión de bosque e información de los habitantes locales, Vulnerable (VU).

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha venido acompañando las iniciativas de conservación de esta especie tanto en estudios sobre caracterización poblacional y uso de hábitat en la región del occidente medio en los municipios de Liborina y Sabanalarga, en donde se han identificado algunas poblaciones viables las cuales es necesario proteger especialmente para evitar la cacería de consumo y uso de animales como mascota.



Mapa de distribución e imagen de *Ara militaris* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.13 GALLITO DE ROCA

Nombre científico:

Rupicola peruviana

Otros nombres comunes:

Gallo de roca.

Historia natural:

Diurno, vive en parejas o en grupos, en época de reproducción se reúnen varios machos y realizan piruetas para atraer las hembras, este ritual se conoce como leck. Son polígamos, se alimentan principalmente de frutas, los pichones son alimentados con proteína animal. Son dispersores de semillas.

Hábitat:

Es una especie muy exigente en hábitat, pues sólo se le encuentra asociado a bosques rodeados de cuerpos de agua y que tengan caídas en roca.

Distribución:



Se les encuentra desde Colombia hasta Bolivia, en nuestro país habitan las regiones del Pacífico y valles interandinos entre los 1400 y 2400 msnm, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA se han detectado poblaciones en los municipios de Caramanta, Jardín, Andes y Ciudad Bolívar.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

No existe un estudio del estado de la población de los gallitos de roca, sin embargo, se puede suponer que están disminuyendo debido a la destrucción sistemática de su hábitat y a la cacería a que son sometidos para animales mascota de jaula.

Avances en su conocimiento y conservación:

Es comparativamente poca la información que se tiene sobre esta especie, Corantioquia realizó en el año 2003 el estudio que tuvo como objetivo la caracterización poblacional y uso de hábitat de tres poblaciones de Gallito de roca en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual definió el estado de estas poblaciones así como las amenazas a que están expuestas. Así mismo, Corantioquia como parte del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia (CIFFA), participa en las estrategias de control al tráfico ilegal de esta especie, de la cual ya se han rescatado y liberado varios individuos.



Mapa de distribución e imagen *Rupicola perviana* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.14 ARRIERO ANTIOQUEÑO

Nombre científico:

Lipaugus weberi

Otros nombres comunes:

Pájaro arriero

Historia natural:

Consume principalmente frutos al interior del bosque, pero también grandes insectos. Generalmente, se observan individuos solitarios y ocasionalmente integran bandadas mixtas (Cuervo et al. 2001).

Hábitat:

Bosques húmedos subandinos entre 1420 y 1850 msnm, posiblemente hasta casi 2000 msnm. Habita en el interior de bosque primarios y menos frecuentemente en el borde de bosque y en los remanentes de vegetación secundaria alrededor de quebradas aledañas a las áreas boscosas (Cuervo et al. 2001).

Distribución:


Esta especie está restringida a bosques húmedos premontanos en la vertiente norte de la Cordillera Central en los municipios de Amalfi y Anorí en Antioquia (Cuervo et al. 1999). Fue descubierta recientemente en la Reserva La Forzosa durante el inventario de las aves de Anorí (Cuervo et al. 2001). Sólo se conoce en pocas localidades de esa región.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Es común en los fragmentos extensos de bosque que aún se conservan en su área de distribución. En Anorí es una especie detectada frecuentemente en especial por su canto. En Amalfi no es tan común, seguramente porque el hábitat está muy intervenido. Esta nueva especie, es endémica de la jurisdicción de CORANTIOQUIA y se encuentra amenazada principalmente por la destrucción de los bosques subandinos de la vertiente norte de la Cordillera Central, fenómeno más acentuado en Amalfi. Está categorizada a nivel nacional como en Peligro Crítico (CR).

Avances en su conocimiento y conservación:

La especie está presente, en las Reservas La Forzosa (1000 ha) y La Serrana (160 ha) ubicadas en el municipio de Anorí, aunque esta última aún sufre una fuerte presión por la extracción de madera, debido a su cercanía con la cabecera municipal.



Mapa de distribución, imagen de *Lipaugus weberi* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.15 PEREZOSO DE DOS DEDOS

Nombre científico:

Choloepus hoffmanni

Otros nombres comunes:

Perezoso de dos uñas, perico ligero, oso perezoso, perico de pelo, perico real.

Historia natural:

Nocturno y diurno, arborícola y solitario. Se alimenta de hojas y retoños de varias plantas y de frutas. Está asociado a bosques de zonas bajas y altas. Vive en la vegetación boscosa densa con abundancia de bromelias, epífitas y lianas, en el dosel medio y alto, permanece guindado de las ramas altas de los árboles. No usa refugios, duerme enrollado en sitios bien enmarañados o aparentando ser un nido. Desciende del árbol donde se alimenta para defecar y orinar, pero no cava un agujero. Se defiende amenazando con los brazos y garras extendidas o tratando de morder. Es buen nadador. Emite silbidos agudos. Es difícil de observar en el campo. La temperatura corporal oscila entre 24 y 33°C. Se aparea principalmente en la época seca, la gestación dura 9 meses, pare una cría que mantiene largo tiempo aferrada a su cuerpo; al año la cría es independiente. El promedio de vida es de 12-20 años.

Hábitat:

Bosque semideciduo, bosque siempre verde, bosque seco, bosque submontano, bosque montano, bosque altimontano; en bosques primarios y secundarios bien conservados.

Distribución:



Centro y Suramérica, desde Nicaragua, Honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador, hasta Bolivia. Colombia: en las regiones central, occidental y norte. Antioquia: en todo su territorio. Por debajo de los 2500 msnm. CORANTIOQUIA: en las Direcciones Territoriales: Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

Especie relativamente común, especialmente en bosques primarios. Hay zonas donde es cazado como fuente de proteínas y para venta como mascota. Está amenazado donde su hábitat ha sido destruido, la dificultad para hallarlo lo ha mantenido protegido.

Avances en su conocimiento y conservación:

Corantioquia ha participado desde el año 1998, en los ejercicios que sobre tratamiento, rehabilitación y reintroducción realiza la Fundación UNAU, cuyo centro funciona en la finca La Luz, en el área rural del municipio de Caldas, Antioquia. Conjuntamente con el MAVDT y otras autoridades ambientales se apoyó el diseño e implementación de la Estrategia de Conservación de Perezosos en donde además, se incluye una serie de piezas educativas.



Mapa de distribución e imagen de *Choloepus hoffmanni* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

6.10 LORO OREJAMARILLO

Nombre científico:

Ognorhynchus icterotis

Otros nombres comunes:

Catarnica, caripero, cotorra de orejas amarillas.

Historia natural:

Existe una estrecha relación entre el loro orejamarillo y las palmas de cera (género *Ceroxylon*), ya que éstas les sirven como lugar de refugio, descanso, alimentación y sobre todo de reproducción, pues son en ellas es donde hace sus nidos, los cuales están generalmente a 20 m de altura, en cavidades con entradas situadas en la parte media o superior de la palma por debajo del follaje, o bien en palmas muertas defoliadas, ahuecadas en el ápice.

Su reproducción es de manera aislada o en colonias. Las parejas pueden utilizar un nido hasta por 5 meses y la misma palma puede alojar diferentes parejas reproductoras de manera consecutiva. Son monógamos, las parejas pueden reproducirse dos veces al año, incluso iniciando la segunda postura con juveniles todavía dependientes (Renjifo et al. 2002). El promedio de pichones por nidada es de dos, la pareja y los juveniles del año anterior, intervienen alternativamente en la alimentación, cuidado y custodia del nido (Rodríguez, 2002). Consume frutos de palma de cera, frutos de otras plantas corteza, yemas, semillas, brotes y flores, el consumo de coco parece tener que ver con la alimentación de los pichones.

La ingestión generalizada de trozos de troncos secos de palma de cera podría estar relacionada con la obtención de minerales o con la necesidad de contrarrestar toxinas. Tiene movimientos migratorios no precisados y aparentemente estacionales, sin embargo, éstos pueden ser forzados por la presión de la caza. Su movilización se intensifica en el momento de la búsqueda del nido, con una duración de 20 a 30 días antes de seleccionar la oquedad donde finalmente anidarán (Rodríguez y Camacho, 2002).

Las bandadas tienen un patrón de movimiento en busca de alimento, llegando a moverse distancias de hasta 15 km, sin embargo, parece probable que los territorios requeridos para mantener poblaciones numerosas deban tener una extensión relativamente grande, pues cabe presumir que se presenten movimientos estacionales correlativos con eventos fenológicos determinantes en la disponibilidad del alimento, como sucede con otros Psitácidos.

Hábitat:

Selvas nubladas, subandinas y andinas, en los bosques húmedos y áreas parcialmente deforestadas, mostrando preferencia por sitios con presencia de palmas de cera entre 2000 y 3480 msnm, aunque en ocasiones desciende hasta 1200 msnm (Renjifo et al. 2002).

Distribución:

Conocidos en la zona altoandina en los tres ramales de la cordillera de los Andes, en Colombia y anteriormente en el norte de Ecuador (Rodríguez 2002). Está presente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño, Quindío, Tolima, Valle y Norte de Santander. CORANTIOQUIA: En los municipios de Jardín, Andes, Támesis, Briceño y Yarumal. Direcciones Territoriales de Citará y Tahamés.

Situación actual y categoría de amenaza nacional:

En la actualidad es una especie endémica de Colombia, pues parece haberse extinguido recientemente en Ecuador, conociéndose la existencia solamente de cuatro poblaciones, dos de las cuales están en la jurisdicción de Corantioquia.

La disminución de la población de loro orejiamarillo se debe a las tasas altas de deforestación en su área de distribución. Las palmas de cera son vulnerables debido a su ausencia de regeneración en los potreros y además son atacadas por una enfermedad que las seca lentamente, aparentemente debida a la interacción de un escarabajo y un hongo al que están expuestas por no estar en el bosque; por otro lado el uso de los cogollos en la celebración del domingo de ramos, es quizás uno de las amenazas más evidentes para la palma y por lo tanto para una de las casas del loro. Otra amenaza con la que se enfrentan es la cacería y saqueo de nidos para obtener pichones y venderlos como mascotas. Está categorizado a nivel nacional como en Peligro Crítico: CR


Avances en su conocimiento y conservación:

Se acompañan iniciativas de conservación de esta especie tanto en estudios sobre la distribución como de su ecología, así como en conservación de hábitat y campañas de educación de acuerdo con el Proyecto Ognorhynchus que lidera la Fundación Proaves. Corantioquia como parte del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, (CIFFA), participa en las estrategias de control al uso de hojas de palma de cera que se realiza en época de Semana Santa.





Mapa de distribución e imagen del *Ognorhynchus icterotis* en la jurisdicción de CORANTIOQUIA



Anexos

El legado quedó impreso en la mente del hombre y ha ido circulando de generación en generación y de manera crítica, respetuosa lo adapta a su tiempo. Es el momento de dar reconocimiento al esfuerzo acopiado.

ANEXO 1

Algunos Estudios e Inventarios Realizados con el Apoyo de Corantioquia, Relacionados con el Componente de Fauna Silvestre.

A continuación se presentan los trabajos, estudios e inventarios realizados por CORANTIOQUIA, relacionados con el componente de fauna silvestre.

En primer lugar se referencian los trabajos generales en donde el componente de fauna se trata de manera general, posteriormente se describen por cada uno de los grupos taxonómicos :Aves, Mamíferos, Anfibios, Réptiles e Insectos, éstos se agruparon por especie u objeto. En la tabla se puede consultar la referencia de la información, si esta reposa en el Centro de Información Ambiental (CIA) de la Corporación, ubicado en la ciudad de Medellín o en otros lugares por fuera de CORANTIOQUIA.

Se registra también la manera como se encuentra la información (tipo), el autor y el año en que se realizó el trabajo, así mismo y con el ánimo de orientar la consulta por tema se definieron los siguientes parámetros:

APOYO AL CONOCIMIENTO:

Se refiere a investigaciones o trabajos realizados con el fin de compilar, analizar o publicar información basada en fuentes secundarias.

DISTRIBUCIÓN:

Hace alusión a investigaciones o trabajos que se hayan apoyado cuyo objetivo fue determinar la existencia de la(s) especie(s) o de sus poblaciones.

MANEJO Y CONSERVACIÓN:

Investigaciones o trabajos que dan pautas para realizar un manejo tanto in situ como ex situ de la(s) especie(s) o de sus poblaciones.

ECOLOGÍA:

Investigaciones o trabajos que aborden la auto ecología de la especie.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA:

Sólo se referencian Investigaciones o trabajos que contemplen caracterización genética.

ESTUDIOS GENERALES

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
645reg	Informe	Inventario de flora y fauna de la reserva La Guarcana, Buriticá-Antioquia	Corantioquia	Distribución	2000
978reg	Informe	Inventario preliminar de fauna del cañón del río Alicante	Avilán, Paola	Distribución	2001
ps	Artículo	Situación de la fauna silvestre en Antioquia	Restrepo Llano, Juan Camilo	Apoyo al conocimiento	2000
1091 reg	Informe	Evaluación del conocimiento del recurso fauna silvestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Arteaga, Maria Clara	Apoyo al conocimiento	2001
160reg	Informe	Inventarios de fauna en áreas de reserva de CORANTIOQUIA	Castaño, Ana M	Apoyo al conocimiento	2001
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Estado del conocimiento de la fauna silvestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Hurtado, Juliana	Apoyo al conocimiento	2.007
92cd	Libro	Fauna silvestre del centro de Antioquia	Restrepo Llano, Juan Camilo	Apoyo al conocimiento.	2002
832fil	Cartilla	Manual del Reubicador de Fauna Silvestre	Restrepo Llano, Juan Camilo	Manejo y conservación	2000
2184le	Informe	Construcción de una base de datos concertada para el manejo de fauna en los municipios de Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jericó y Támesis	Restrepo, Héctor Francisco	Manejo y conservación	2002

ESTUDIOS SOBRE AVES

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
361reg	Informe	Modelo de recomposición de ecosistemas, hábitat para diferentes especies de aves	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.	Manejo y conservación	1997
446fil	Cartilla	Anotaciones sobre autoecología de la avifauna del altiplano norte de Antioquia	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.	Distribución	1997
844reg	Informe	Componente avifauna del ecosistema "Ladera Oriental de Barbosa". En: Identificación de ecosistemas estratégicos urbanos en el Valle de Aburrá. Área Metropolitana	Muñoz, Javier	Distribución	2000

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
2185le	Informe	Efecto de la fragmentación de hábitat sobre aves de bosque subandino en los municipios de Amalfi y Anorí	Cuervo, Andrés Mauricio	Ecología	2002
1750reg	Informe	Inventario preliminar de la avifauna en la Reserva Regional Bajo Cauca-Nechí, en jurisdicción de CORANTIOQUIA	Ochoa, José Manuel	Distribución	2002
154cd	Informe	Inventario y caracterización de la avifauna asociada a 10 ojos de agua salada en la jurisdicción de la Corporación	Londoño, Carmen Florinda	Distribución	2002
1150reg	Informe	Inventarios de avifauna en áreas de reserva y/o interés de la Corporación	Castañó, Ana María	Distribución	2002
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Monitoreo participativo de la avifauna en el área de influencia del distrito de manejo integrado Cañón del río Alicante	Ochoa, José Manuel	Manejo y conservación	2004
306cd	Informe	Distribución de la diversidad de aves amenazadas en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Gómez, Ana María	Distribución	2004
313cd	Informe	Caracterización de los ojos de agua sal del centro de Antioquia y su relación con la avifauna	Restrepo Llano, Juan Camilo	Manejo y conservación	2004
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Investigación de variables ambientales y diversidad de aves en el Noroccidente colombiano	Arango, Ana María	Manejo y conservación	2003
468cd	Informe	Inventario de la avifauna de la zona de influencia del Alto de Ventanas y río Oro, vertiente norte de la cordillera Central, Antioquia	Pulgarín, Paulo	Distribución	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Apoyo al programa de conservación in situ de guacamaya verde limón (Ara ambigua) en el centro de rehabilitación Farallones de La Pintada	Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín	Manejo y conservación	2007
189cd	Informe	Caracterización poblacional y uso de hábitat de una población de guacamaya verde (Ara militaris) en el occidente medio Antioqueño	Fundación Proaves	Manejo y conservación	2004
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Inventario y caracterización de las poblaciones de psitácidos en el Valle de Aburrá	Flórez Valencia, Pablo	Distribución	2007

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
827reg	Informe	Ubicación de algunas poblaciones del paujil de cara azul(Crax Alberti) en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño	Sociedad Antioqueña de Ornitología	Distribución	2000
1151reg	Informe	Estudio preliminar de algunos aspectos demográficos y utilización de hábitat del paujil Cara Azul (Crax alberti)	Ochoa, José Manuel	Ecología	2002
2174le	Informe	Programa de conservación y cría en cautiverio del paujil cara azul (Crax Alberti), que permita obtener individuos para programas de conservación ex situ de la especie y futuros programas de reintroducción en hábitats naturales	Fundación Ecolombia	Manejo y conservación	2002
432fil	Cartilla	Manejo ex situ para la conservación del paujil de cara azul (Crax Alberti), en el departamento de Antioquia	Fundación Ecolombia	Manejo y conservación	2003
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización de tres núcleos poblacionales del paujil de pico azul (Crax alberti) en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño	González, Juan David	Manejo y conservación	2003
192cd	Informe	Evaluación de la cacería de subsistencia y la pérdida de hábitats sobre algunas poblaciones naturales del paujil de cara azul(Crax alberti,, en los municipios de Anorí, Puerto Berrío y Remedios en el Nororiente de Antioquia	Melo, Isabel	Manejo y conservación	2003
415cd	Informe	Determinación de la variabilidad del paujil cara azul (Crax alberti) por medio de secuencias micro-satélites	Ramírez, Luz Adriana	Caracterización genética	2005
1416le	Artículo	Nuevos registros y notas sobre la historia natural del paujil colombiano (Crax Alberti) al Nororiente de la cordillera Central Colombiana	Ochoa, José Manuel	Distribución	2005
196cd	Informe	Estudio de la ecología de una población de loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) en el Suroeste del departamento de Antioquia y norte de Caldas con fines de conservación	Valencia, Pablo Flórez	Ecología	2002

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
194cd	Informe	Establecimiento de criterios para la protección y conservación del loro orejiamarillo (<i>Ognorhynchus icterotis</i>) en el Suroeste de Antioquia	Fundación Proaves	Manejo y conservación	2003
468cd	Informe	Caracterización preliminar de una población de loro orejiamarillo (<i>Ognorhynchus icterotis</i>) en el Noroeste de Antioquia	Colorado, Gabriel Jaime	Ecología	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización Poblacional y uso de Hábitat de Tres Poblaciones de gallito de roca (<i>Rupícola Peruviana</i>) en el centro del departamento de Antioquia	Londoño, Carmen Florinda	Manejo y conservación	2003
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Conservación y manejo de la paloma collaraja (<i>Columba fasciata</i>) en el parque regional Arví	Castaño, Ana M	Manejo y conservación	2004
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Monitoreo de la migración de falconiformes y otras aves migratorias por el área de la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Instituto Alexander von Humboldt	Distribución	2004
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Estudio del ave migratoria amenazada reinita cielo azul (<i>Dendroica cerulea</i>) en el Suroeste antioqueño	Colorado, Gabriel Jaime	Distribución	2007
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Establecimiento de protocolos y ensayos preliminares de reproducción ex situ del perico real (<i>Brotogenis jugularis</i>) en el centro de Antioquia.	Dinámica S.A	Manejo y conservación	2005
1517le	Informe	Estado de conservación de las especies de aves amenazadas o casi amenazadas de extinción en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA	Cuervo, Andrés Mauricio	Apoyo al conocimiento	2001
2112le	Libro	Aves en peligro de extinción en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Toro Murillo, Juan Lázaro y Cuervo, Andrés Mauricio	Apoyo al conocimiento	2002
467cd	Informe	Compendio de las aves reportadas en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Cuervo, Andrés Mauricio Cuervo	Apoyo al conocimiento	2005

ESTUDIOS SOBRE MAMÍFEROS

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
844regz	Informe	Componente de mamíferos del ecosistema “Ladera Oriental de Barbosa”. En: Identificación de ecosistemas estratégicos urbanos en el Valle de Aburrá	Cuartas Calle, Carlos A	Distribución	2000
1040reg	Informe	Inventario preliminar de los mamíferos del área del proyecto de Reserva regional La Forzosa, municipio de Anorí, Antioquia	Delgado, Carlos Andrés	Distribución	2001
1387fil	Cartilla	Inventario preliminar de los mamíferos en dos sectores de los municipios de Jardín y Andes, cordillera Occidental, Antioquia	Delgado, Carlos Andrés	Distribución	2001
1754reg	Informe	Inventario preliminar de los mamíferos no voladores del Cerro Romeral, El Chupadero, Cerro del Padre Amaya y Miraflores	Delgado, Carlos Andrés	Distribución	2001
1612reg	Informe	Inventario, usos y conocimiento de la mastofauna terrestre silvestre presentes en seis áreas de reserva de CORANTIOQUIA	Builes, Diego Fernando	Distribución	2001
468cd	Informe	Inventario de la fauna de mamíferos no voladores del Alto de Ventanas, municipio de Yarumal	Díaz, Juan Fernando y Sánchez Camilo	Distribución	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Inventario y Caracterización Genética de las Poblaciones de oso andino en las Cordilleras Central y Occidental	Restrepo, Héctor Francisco	Distribución y Caracterización genética	2002
414cd	Informe	Caracterización citogenética de cuatro especies de mamíferos: ardilla común, Cusumbo solo, mono aullador y mico cariblanco	INGEIN Ltda.	Caracterización genética	2001
317cd	Informe	Búsqueda de poblaciones y algunos aspectos de la utilización de hábitat de la danta Colombiana Tapirus terrestres colombianus, en el Nordeste Antioqueño	Arcila, Diego A	Distribución	2004
239av	Video	Plan de recuperación del manatí-Ciénagas del Totumo, corregimiento de San Miguel del Tigre, municipio de Yondó -Magdalena Medio Antioqueño	Ramos, Carlos Roberto	Manejo y conservación	1997

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Seguimiento y Caracterización de Población de manatí (<i>Trichechus manatus</i>) en la Ciénaga el totumo, municipio de Yondó	Acosta, José Manuel	Manejo y conservación.	2002
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización Poblacional, Uso y Mejoramiento Ambiental de hábitat del manatí (<i>Trichechus manatus</i>) en el Magdalena Medio Antioqueño	Acosta, José Manuel	Manejo y conservación	2003
136cd	Informe	Búsqueda del Venado conejo <i>Pudu mephistophiles</i> en el páramo de Belmira, Antioquia: informe final	Delgado, Carlos Andrés	Distribución	2003
157cd	Informe	Establecimiento de lineamientos técnicos para desarrollar las actividades de manejo, rehabilitación post decomiso de tití piel roja (<i>Saguinus oedipus</i>)	Cañas, Néstor Mauricio	Manejo y conservación	2003
165cd	Informe	Distribución histórica y actual, uso de hábitat y estimación del estado de conservación del tití gris (<i>Saguinus leucopus</i>) en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA	Cuartas Calle, Carlos A	Distribución	2004
469cd	Informe	Puntos críticos de extracción y tráfico ilegal del tití gris (<i>Saguinus leucopus</i>) en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA	Cubillos, Diana	Manejo y conservación	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización genética de primates en cautiverio en el CAV	Del Valle, Carlos	Caracterización genética	2007
336cd	Informe	Distribución, uso de microhábitats y dietas de la nutria neotropical <i>Lontra longicaudis</i> , en el cañón del río Alicante, Antioquia	Arcila, Diego A	Ecología	2003
337cd	Informe	Situación y distribución de la nutria neotropical <i>Lontra longicaudis</i> en la cuenca del río San Juan, Antioquia	Arcila, Diego A	Distribución	2003
465cd	Informe	Aproximación a la existencia de la nutria <i>Lontra longicaudis</i> , su afectación y grados de amenazas en la Dirección Territorial Panzenú, Bajo Cauca antioqueño	García Barros, Fabio León	Distribución y Manejo y conservación	2006

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
263cd	Informe	Implementación de un modelo de aprovechamiento sostenible del ponche <i>Hydrochaeris hydrochaeris isthmus</i> , Cauca, Antioquia	Restrepo, Mónica	Manejo y conservación	2004
2301le	Informe	Monitoreo de la rehabilitación del mono aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>) mantenido en cautiverio en el centro de rehabilitación de fauna silvestre Farallones de La Pintada (Antioquia)	Rojas, Luis Javier	Manejo y conservación	2002
88cd	Informe	Seguimiento y evaluación del proceso de rehabilitación de una población de mono aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>) en condiciones de semicautiverio en el municipio de La Pintada, Antioquia	Fundación Ecolombia	Manejo y conservación	2003
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Monitoreo de tres grupos de Mono Aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>) en el municipio de La Pintada, Antioquia	Ramos Betancur, Clara Lía	Manejo y conservación	2005
450cd	Informe	Determinación de la variabilidad genética en ejemplares cautivos de mono aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>).	Hurtado, Julio Cesar	Caracterización genética	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización de una población de Mono Aullador rojo (<i>Alouatta seniculus</i>), en el municipio de Jericó-Antioquia	Vélez, Carlos Mario	Manejo y conservación	2007
190cd	Informe	Estudio de la distribución, hábitat y estimación de estado de conservación del perezoso de dos uñas (<i>Choloepus hoffmanni</i>) en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA	Fundación UNAU	Distribución	2003
411cd	Informe	Protocolos de rehabilitación, reintroducción o reubicación de perezosos de dos uñas (<i>Choloepus hoffmanni</i>) y de tres uñas (<i>Bradypus variegatus</i>)	Fundación UNAU	Manejo y conservación	2005
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Establecimiento e implementación de un protocolo de rehabilitación y traslocación de individuos de la fauna silvestre pertenecientes a la familia felidae: <i>Leopardus pardalis</i> , <i>Leopardus wiedii</i> , con fines de conservación y regulación en procesos post-decomiso	Cañas, Nestor Mauricio		2003

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Diagnóstico de la situación actual de depredación de ganado por felinos silvestres en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Quiroz, Víctor Hugo	Manejo y conservación	2005
1643reg	Informe	Composición, abundancia, diversidad y riqueza de la comunidad de murciélagos presentes en algunas reservas de CORANTIOQUIA	Urrego, Dany Sulay	Distribución	2001
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Investigación de variables ambientales y diversidad de quirópteros en el noroccidente Colombiano	Arango, Ana María	Manejo y conservación	2003
148cd	Informe	Murciélagos de la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Muñoz, Javier	Apoyo al conocimiento	2003
193cd	Informe	Distribución espacial de la diversidad de murciélagos y su relación con el SIRAP en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Arango Ana María	Distribución	2004
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Compendio de mamíferos existentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Cuartas Calle, Carlos A	Apoyo al conocimiento	2004

ESTUDIOS SOBRE HERPETOFAUNA

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Estudio preliminar sobre la distribución y abundancia relativa de la herpetofauna dentro del área Metropolitana del valle de Aburrá	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	Distribución	2000
844reg	Informe	Componente herpetofauna del ecosistema "Ladera oriental de Barbosa". En: Identificación de ecosistemas estratégicos urbanos en el Valle de Aburrá	Daza, Juan Manuel	Distribución	2000
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Inventario de herpetofauna en áreas de la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Avilán, Paola	Distribución	2001
1268reg	Informe	Inventario preliminar de la herpetofauna en la reserva regional Bajo Cauca-Nechí, en jurisdicción de CORANTIOQUIA	González, Juan David	Distribución	2002
335cd	Informe	Anfibios y reptiles reportados en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA	Galeano Muñoz, Sandra Patricia	Distribución	2004

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
468cd	Informe	Inventario de la herpetofauna del Alto de Ventanas con énfasis en la herpetofauna arbórea en los municipios de Yarumal, Briceño y Valdivia	Barrientos Correa, Lucas	Distribución	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Caracterización de las poblaciones de ofidios en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Arredondo, Juan Camilo	Distribución	2007
195cd	Informe	Efecto del tamaño de fragmentos sobre la diversidad y tamaño corporal de anuros andinos en el Nororiente Antioqueño	Galeano Muñoz, Sandra Patricia	Ecología	2002
432cd	Informe	Estudio de algunos aspectos de biología poblacional e historia natural de <i>Rhamphophryne macrorhina</i> y <i>Eleutherodactylus suetus</i> en bosques de la cordillera Central Colombiana	Galeano Muñoz, Sandra Patricia	Ecología	2006
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Manejo y conservación in situ de tortugas y caimanes en ciénagas y sectores del río Magdalena en el municipio de Puerto Berrío	Asociación de pescadores de Puerto Berrío (ASOPESCA)	Manejo y con- servación	2003

ESTUDIOS SOBRE PECES

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Inventario de la ictiofauna en áreas de CORANTIOQUIA	García Barros, Fabio León	Distribución	2001
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Inventario parcial de ictiofauna en las cuencas de las quebradas Guaracú, La Muñoz, Los Cedros y el río Aurra en el municipio de San Jerónimo	García Barros, Fabio León	Distribución	2001

ESTUDIOS SOBRE INSECTOS

REFERENCIA Y/O UBICACIÓN	TIPO	TÍTULO	AUTOR	REFERENCIA	AÑO
Subdirección de Ecosistemas	Informe	Diagnóstico del estado de conocimiento de insectos de la jurisdicción de CORANTIOQUIA	Suaza, Juan David	Distribución	2005

ANEXO 2

Listado Oficial de Aves Presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA

A continuación se presenta el listado oficial de las aves silvestres presentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Con el fin de universalizar la información presentada se definieron los siguientes campos:

° **Taxón:**

Se refiere al Orden, familia, genero y especie según Remsen et al 2006.

° **Nombre vernáculo:**

Nombre común dado a la especie, en su mayoría estos nombres fueron tomados de la Guía en español de las aves de Colombia (Álvarez-López) la lista de chequeo de las aves de Colombia.

° **Categoría de Amenaza Nacional:**

Parámetro tomado de los libros rojos publicados por el Instituto Alexander von Humboldt.

° **Endemismo:**

Se refiere al nivel de restricción en su distribución Nal: De orden nacional, REST: Restringida y LOC: local.

° **Distribución Altitudinal:**

Rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar) en que normalmente y de manera natural se encuentra la especie.

° **Territoriales:**

Se refiere a las jurisdicciones de las Direcciones Territoriales en que esta administrativamente dividida CORANTIOQUIA y en cuyo territorio se verifico la presencia de la especie: CI: Citara; CA: Cartama; HE: Hevéxicos; AS: Aburra sur; AN: Aburra Norte; TA: Tahamíes; ZE: Zenufaná; PA: Panzenú.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN TINAMIFORMES												
Familia Tinamidae												
<i>Tinamus osgoodi</i>	Tinamú negro	EN	NAL	1500-2100						X		
<i>Tinamus major</i>	Tinamú grande			0-1000						X	X	X
<i>Nothocercus bona-partei</i>	Tinamú de montaña			1500-2200				X				
<i>Nothocercus julius</i>	Tinamú leonado			1700-3100	X					X		
<i>Crypturellus erythropus</i>	Tinamú patirrojo	EN		0-1300*							X	X
<i>Crypturellus soui</i>	Tinamú chico			0-2000		X	X	X	X	X	X	X
ORDEN ANSERIFORMES												
Familia Anhimidae												
<i>Chauna chavaria</i>	Chavarría	VU	REST	0-200							X	X
Familia: Anatidae												
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Pisingo maría			0-2600					X		X	X
<i>Dendrocygna viduata</i>	Pisingo careta			0-2600					X			X
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Pisingo común			0-2600		X			X		X	X
<i>Cairina moschata</i>	Pato real			0-2600*			X		X		X	
<i>Merganetta armata</i>	Pato de los torrentes			1500-3500	X					X		
<i>Anas flavirostris</i>	Pato paramuno			2600-4300	X			X				
<i>Anas discors</i>	Pato careto			0-3600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Anas cyanoptera</i>	Pato colorado			0-1000							X	X
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharo			0-2600							X	X
<i>Nomonyx dominicus</i>	Pato encapuchado			0-2600*			X					
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato andino	EN		2500-4000	X					X		
ORDEN GALLIFORMES												
Familia Cracidae												
<i>Ortalis garrula</i>	Guacharaca caribeña		NAL	0-800	X						X	X
<i>Ortalis colombiana</i>	Guacharaca colombiana			100-2500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Penelope montagnii</i>	Pava andina			2200-3400						X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Penelope purpurascens</i>	Pava moñuda			0-1000							X	X
<i>Aburria aburri</i>	Pava negra	NT		600-2500	X					X	X	X
<i>Chamaepetes goudotii</i>	Pava mara-quera			1500-3000	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Crax alberti</i>	Pajúí colombiano	CR	NAL	0-1200						X	X	X
Subfamilia Odontophoridae												
<i>Colinus cristatus</i>	Perdiz común			0-3100		X	X		X		X	X
<i>Odontophorus gujanensis</i>	Perdiz corcovada			0-1200							X	X
<i>Odontophorus erythrops</i>	Perdiz collareja			0-1100							X	
<i>Odontophorus hyperythrus</i>	Perdiz colorada	NT	NAL	1600-2700	X	X		X	X	X	X	
<i>Rhynchortyx cinctus</i>	Perdiz selvática			0-1000						X		
ORDEN PODICIPEDIFORMES												
Familia Podicipedidae												
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Zambullidor chico			0-2600		X			X			
<i>Podilymbus podiceps</i>	Zambullidor común			0-3100		X	X		X			X
ORDEN PELECANIFORMES												
Familia Pelecanidae												
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pelícano común			0-3000					X			X
Familia Phalacrocoracidae												
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán neotropical			0-2600		X	X		X		X	X
Familia Anhingidae												
<i>Anhinga anhinga</i>	Pato aguja			0-1000*					X	X	X	X
ORDEN CICONIIFORMES												
Familia Ardeidae												
<i>Ptilinopus pileatus</i>	Garza crestada			0-500							X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Ardea herodias</i>	Garzón migratorio			0-2600								X
<i>Ardea cocoi</i>	Garzón azul			0-1500		X			X	X	X	X
<i>Ardea alba</i>	Garza real			0-2600*		X	X		X		X	X
<i>Egretta caerulea</i>	Garza azul			0-2600		X	X		X	X	X	X
<i>Egretta thula</i>	Garza patiamarilla			0-2600		X			X		X	X
<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita del ganado			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Butorides striata</i>	Garcita rayada			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Butorides virescens</i>	Garcita verde			0-2600							X	
<i>Agamia agami</i>	Garza colorada			0-500								X
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Guaco común			0-2600*					X			X
<i>Nyctanassa violacea</i>	Guaco manglero			0-500					X			
<i>Cochlearius cochlearius</i>	Garzón cucharón			0-800					X			X
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Vaco cabecinegro			120-1800				X			X	
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Vaco colorado			0-1600*		X					X	X
<i>Ixobrychus exilis</i>	Avetorillo bicolor			0-3100					X	X		
Familia Threskiornithidae												
<i>Theristicus caudatus</i>	Coclí			0-1600*								X
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Ibis verde			0-500		X					X	X
<i>Phimosus infuscatus</i>	Coquito			0-1000							X	X
<i>Eudocimus albus</i>	Ibis blanco			0-500								X
<i>Platalea ajaja</i>	Espátula			0-1000								X
Familia Ciconiidae												
<i>Mycteria americana</i>	Cabeza de hueso			0-2200								X
<i>Jabiru mycteria</i>	Garzón soldado			0-500								X
ORDEN FALCONIFORMES												
Familia Cathartidae												
<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Cathartes aura</i>	Guala común			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Cathartes burrovianus</i>	Guala sabanera			0-1000							X	X
<i>Sarcoramphus papa</i>	Rey de los gallinazos			0-3300*	X	X	X			X	X	X
Familia Pandionidae												
<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora			0-3300	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Acciptridae												
<i>Leptodon cayanensis</i>	Aguililla cabecigris			0-1000							X	
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Caracolero selvático			0-1000		X		X				X
<i>Elanoides forficatus</i>	Aguililla tijereta			0-2600		X		X	X	X	X	X
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Aguililla enana			0-1000		X			X	X	X	
<i>Elanus leucurus</i>	Aguililla blanca			0-2600*		X	X	X	X	X	X	X
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Caracolero común			0-1000		X					X	X
<i>Helicolestes hamatus</i>	Caracolero negro			0-700								X
<i>Harpagus bidentatus</i>	Gavilán lagartero			0-1200	X						X	X
<i>Ictinia mississippiensis</i>	Aguililla del Mississippi			Migratoria			X					
<i>Ictinia plumbea</i>	Aguililla plomiza			0-2600				X		X	X	X
<i>Circus cyaneus</i>	Lagunero migratorio			0-2600		X						
<i>Accipiter superciliosus</i>	Azor diminuto			0-1500						X	X	
<i>Accipiter collaris</i>	Azor collarejo	NT		600-1800	X					X	X	
<i>Accipiter striatus</i>	Azor cordillerano			900-3400*		X	X	X	X	X		
<i>Accipiter bicolor</i>	Azor bicolor			0-2000	X	X						
<i>Geranoospiza caerulescens</i>	Aguililla zancona			0-500							X	X
<i>Leucopternis plumbea</i>	Águila pizarra	NT		700-800								X
<i>Leucopternis princeps</i>	Águila príncipe			0-1800								X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Leucopternis semi-plumbea</i>	Águila gris			0-1000						X		
<i>Leucopternis albigollis</i>	Águila blanca			0-1400						X	X	X
<i>Buteogallus anthracinus</i>	Cangrejero negro			0-500				X			X	
<i>Buteogallus urubitinga</i>	Cangrejero mayor			0-1000				X				
<i>Buteogallus meridionalis</i>	Águila saba- nera			0-1000					X	X	X	X
<i>Parabuteo unicinctus</i>	Águila rabi- blanca			0-1500				X			X	
<i>Busarellus nigricollis</i>	Águila cien- guera			0-500							X	X
<i>Geranoaetus melanolencus</i>	Águila para- muna			1600-3500					X	X		
<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	Águila solitaria	EN		0-2200					X	X		
<i>Asturina nitida</i>	Águila barrada			0-600	X	X			X		X	X
<i>Buteo magnirostris</i>	Gavilán cambrero			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Buteo platypterus</i>	Gavilán migratorio			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Buteo leucorrhous</i>	Gavilán negro			0-2900				X	X			
<i>Buteo brachyurus</i>	Águila rabi- corta			0-1800	X	X	X	X	X	X		X
<i>Buteo swainsoni</i>	Gavilán cualesmero			0-2800	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Buteo albicaudatus</i>	Águila coli- blanca			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Buteo polysoma</i>	Águila andina			1800-3200	X					X		
<i>Buteo albonotatus</i>	Águila galli- naza			0-500								X
<i>Harpia harpyja</i>	Arpía	NT		0-1000						X		X
<i>Spizaetus tyrannus</i>	Águila igua- nera			0-500					X	X	X	X
<i>Spizaetus ornatus</i>	Águila coro- nada			0-1200						X	X	X
<i>Oroaetus isidori</i>	Águila cres- tada	EN		300-3300	X	X						
Familia Falconidae												
<i>Ibycter americanus</i>	Cacao avis- pero			0-1400						X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Caracara cheriway</i>	Guaraguaco común			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Milvago chimachima</i>	Pigua			0-1800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Guaco			0-2400		X		X	X	X	X	X
<i>Micrastur ruficollis</i>	Halcón pajarero			0-2500						X	X	X
<i>Micrastur semitorquatus</i>	Halcón collarajo			0-1000						X		
<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo			0-3200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Falco femoralis</i>	Halcón plomizo			0-1000		X				X	X	
<i>Falco columbarius</i>	Halcón esmerajón			0-3400		X	X		X			
<i>Falco rufigularis</i>	Halcón murcielaguero			0-1600		X	X				X	X
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino			0-2800		X	X	X	X			
ORDEN GRUIFORMES												
Familia Aramidae												
<i>Aramus guarauna</i>	Carrao			0-400			X		X			X
Familia Rallidae												
<i>Anurolimnas viridis</i>	Polluela cabecirufa			0-900						X	X	X
<i>Laterallus albigularis</i>	Polluela chocoana			0-1600	X	X		X	X		X	
<i>Aramides cajanea</i>	Chilacó colinegro			0-2300		X			X		X	
<i>Porzana carolina</i>	Polluela migratoria			0-2600					X			
<i>Porzana albicollis</i>	Polluela cienaguera			0-1000						X		
<i>Pardirallus nigricans</i>	Rascón caucano			800-2200	X	X		X	X	X		
<i>Porphyrio martinica</i>	Polla azul			0-2600*		X		X	X	X	X	X
<i>Gallinula chloropus</i>	Polla gris			0-3100		X	X		X	X		X
Familia Heliornithidae												
<i>Heliornis fulica</i>	Colimbo selvático			0-500		X	X					
Familia Eurypygidae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Eurypyga helias</i>	Garza del sol			0-600						X	X	X
ORDEN CHARADRIIFORMES												
Familia Charadriidae												
<i>Vanellus chilensis</i>	Caravana			0-3100*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Charadrius vociferus</i>	Chorlito colirrojo			0-2600			X					
<i>Charadrius collaris</i>	Chorlito collarejo			0-1000					X		X	X
Familia Recurvirostridae												
<i>Himantopus mexicanus</i>	Cigüeñuela			0-2600								X
Familia Scolopacidae												
<i>Gallinago delicata</i>	Caica común			0-3900					X			
<i>Gallinago nobilis</i>	Caica paramuna			2000-3900*						X		
<i>Gallinago undulata</i>	Caica gigante			1500	X							
<i>Tringa melanoleuca</i>	Andarrios mayor			0-3000*	X				X			
<i>Tringa flavipes</i>	Andarrios patiamarillo			0-3300*					X		X	X
<i>Tringa solitaria</i>	Andarrios solitario			0-3000*		X		X	X	X	X	X
<i>Actitis macularius</i>	Andarrios maculado			0-3300			X	X	X	X	X	X
<i>Calidris mauri</i>	Correlimos picudo			0-500								X
<i>Calidris minutilla</i>	Correlimos diminuto			0-1000					X			
<i>Calidris melanotos</i>	Correlimos pectoral			0-3100						X		
Familia Jacanidae												
<i>Jacana jacana</i>	Gallito de ciénaga			0-2600		X		X	X	X	X	X
Familia Laridae												
<i>Larus atricilla</i>	Gaviota reidora			0-3100	X				X		X	
<i>Sterna supercilialis</i>	Gaviotín fluvial			0-500							X	
Familia Rynchopidae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Rynchops niger</i>	Picotijera			0-500								X
ORDEN COLUMBIFORMES												
Familia Columbidae												
<i>Patagioenas speciosa</i>	Paloma escamada			0-1300*						X	X	X
<i>Patagioenas fasciata</i>	Paloma collareja			2000-3000	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Patagioenas cayennensis</i>	Paloma morada			0-2100*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Patagioenas plumbea</i>	Paloma plomiza			0-2100								X
<i>Patagioenas subinacea</i>	Paloma colorada			0-2800		X	X	X	X	X	X	X
<i>Zenaida auriculata</i>	Torcaza nágüblanca			600-3400	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Columbina passerina</i>	Tortolita pechiescamada			0-2100						X		X
<i>Columbina minuta</i>	Tortolita diminuta			0-1400		X		X			X	X
<i>Columbina talpacoti</i>	Tortolita común			0-2400*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Columbina squammata</i>	Tortolita colilarga			0-500							X	
<i>Claravis pretiosa</i>	Tortolita azul			0-1800*			X	X			X	
<i>Claravis mondetoura</i>	Tortolita chusquera			2000-2600		X						
<i>Leptotila verreauxi</i>	Tortolita rabiblanca			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Leptotila plumbeiceps</i>	Tortolita cabeciazul			1000-2600	X	X						
<i>Leptotila cassini</i>	Tortolita ojirroja			0-900							X	
<i>Geotrygon veraguensis</i>	Paloma-Perdiz cariblanca			0-900						X		X
<i>Geotrygon linearis</i>	Paloma-Perdiz lineada			300-2500			X		X	X		
<i>Geotrygon frenata</i>	Paloma-Perdiz bigotuda			900-2500						X		
<i>Geotrygon violacea</i>	Paloma-Perdiz violácea			0-1650						X		
<i>Geotrygon montana</i>	Paloma-Perdiz roja			0-2600						X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN PSITTACIFORMES												
Familia Psittacidae												
<i>Ara ararauna</i>	Guacamaya azul y amarilla			0-500		X			X		X	X
<i>Ara militaris</i>	Guacamaya verde	VU		0-2000			X				X	X
<i>Ara ambiguus</i>	Guacamaya verdelimón	VU		0-600								X
<i>Ara macao</i>	Guacamaya bandera			0-500								X
<i>Ara chloropterus</i>	Guacamaya roja			0-500					X	X		
<i>Ara severa</i>	Guacamaya cariseca			0-1000				X	X		X	X
<i>Ognorhynchus icterotis</i>	Loro oreja-marillo	CR	REST	1200-3480*	X					X		
<i>Aratinga wagleri</i>	Perico chocolero			350-2800		X	X	X	X		X	X
<i>Aratinga pertinax</i>	Perico carisucio			0-1000	X	X	X	X	X		X	X
<i>Bolborhynchus lineola</i>	Periquito barrado			1600-2600	X	X				X		
<i>Forpus conspicillatus</i>	Periquito cascabelito			200-2600*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Brotogeris jugularis</i>	Periquito bronceado			0-1000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Touit dilectissimus</i>	Periquito alirrojo			100-1700	X					X	X	
<i>Pionopsitta haematotis</i>	Cotorra cabe-ciparda			600-1200					X	X	X	X
<i>Pionopsitta pyrrhia</i>	Cotorra cabe-ciamarilla	VU	REST	0-1700*					X	X	X	X
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Cotorra montañera	VU	LOC	2000-3600						X		
<i>Pionus menstruus</i>	Cotorra cheja			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Pionus tumultuosus</i>	Cotorra carateja			1600-3000	X							
<i>Pionus chalcopterus</i>	Cotorra maicera			1400-2400		X		X	X	X	X	
<i>Amazona autumnalis</i>	Lora petirroja		CARISM	0-1000				X	X		X	
<i>Amazona festiva</i>	Lora festiva			0-500					X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Amazona ochrocephala</i>	Lora común		CARISM	0-500	X	X	X	X	X		X	X
<i>Amazona amazonica</i>	Lora cariamarilla			0-500		X			X	X	X	X
<i>Amazona mercenaria</i>	Lora andina			1600-3600	X					X		
<i>Amazona farinosa</i>	Lora real			0-1100					X		X	X
ORDEN CUCULIFORMES												
Familia Cuculidae												
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Cuclillo piquinegro			0-1600					X			X
<i>Coccyzus americanus</i>	Cuclillo migratorio			0-2600	X	X	X	X	X	X		
<i>Coccyzus lansbergi</i>	Cuclillo canelo			0-600								X
<i>Playa cayana</i>	Cuco ardilla			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Playa minuta</i>	Cuco enano			0-1600		X	X				X	
<i>Crotophaga major</i>	Garrapatero mayor			0-1600		X	X	X	X		X	X
<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero común			0-2700*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero cirigüelo			0-500			X			X		X
<i>Tapera naevia</i>	Tres-pies			0-1800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Cuco faisán			0-1300							X	
<i>Neomorphus geoffroyi</i>	Correcaminos collarejo			0-1000							X	X
ORDEN STRIGIFORMES												
Familia Tytonidae												
<i>Tyto alba</i>	Lechuza común			0-3000	X		X	X	X			X
Familia Strigidae												
<i>Megascops choliba</i>	Currucutú común			0-2800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Megascops petersoni</i>	Currucutú canelo			1300-3250						X		
<i>Megascops albogularis</i>	Currucutú gorgiblanco			2000-3000				X	X	X		
<i>Bubo virginianus</i>	Búho real			0-4000				X	X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Ciccaba virgata</i>	Búho moteado			0-2000	X	X			X	X	X	X
<i>Ciccaba nigrolineata</i>	Búho carin negro			0-2400*							X	
<i>Ciccaba albitarsis</i>	Búho ocelado			1700-3000		X	X	X	X			
<i>Lophotrix cristata</i>	Búho crestado			0-500						X	X	
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Búho de anteojos			0-1000					X		X	X
<i>Glaucidium nubicola</i>	Buhito nubicola	VU		1100-1600	X							
<i>Glaucidium jardinii</i>	Buhito andino			2100-2800					X			
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Buhito ferrugíneo			0-1000						X		
<i>Pseudoscops clamator</i>	Búho rayado			0-1600*			X		X			
<i>Asio stygius</i>	Búho orejudo			1700-3000					X			
ORDEN CAPRIMULGIFORMES												
Familia Steatornithidae												
<i>Steatornis caripensis</i>	Guácharo			0-3000		X			X		X	
Familia Nyctibiidae												
<i>Nyctibius grandis</i>	Bienparado mayor			0-400								X
<i>Nyctibius griseus</i>	Bienparado común			0-1900	X	X		X		X	X	X
Familia Caprimulgidae												
<i>Chordeiles acutipennis</i>	Chotacabras menor			0-1000							X	X
<i>Chordeiles minor</i>	Chotacabras migratorio			0-2600		X	X		X	X	X	X
<i>Nyctidromus albigollis</i>	Guardacamínos común			0-2300	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Nyctiphrynus rosenbergi</i>	Guardacamínos chocoano	NT	REST	50-900	X							
<i>Caprimulgus carolinensis</i>	Guardacamínos de Carolina			1000-2600					X			
<i>Caprimulgus longirostris</i>	Guardacamínos andino			1600-3600	X	X		X	X	X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Caprimulgus cayen-nensis</i>	Guardacaminos rastrojero			0-2100		X	X					
<i>Uropsalis lyra</i>	Guardacaminos lira			800-2500				X		X		
<i>Uropsalis segmen-tata</i>	Guardacaminos tijereta			2500-3500	X							
ORDEN APODIFORMES												
Familia Apodidae												
<i>Cypseloides cryptus</i>	Vencejo barbiblanco			300-1200				X				
<i>Streptoprocne rutila</i>	Vencejo cuellirrojo			800-3300*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo de collar			0-3500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Chaetura spini-caudus</i>	Vencejo lomiblanco			0-1500						X	X	X
<i>Chaetura cinerei-ventris</i>	Vencejo ceniciento			0-1800	X				X	X	X	X
<i>Chaetura pelagica</i>	Vencejo de chimenea			2500		X		X	X			X
<i>Chaetura chapmani</i>	Vencejo de Chapman			100-1600						X		X
<i>Chaetura brachyura</i>	Vencejo rabicorto			0-800						X	X	X
<i>Panyptila cayen-nensis</i>	Vencejo rabihorcado			0-1400	X	X			X	X		X
Familia Trochilidae												
<i>Eutoxeres aquila</i>	Pico de hoz			0-2100						X		
<i>Glaucis hirsutus</i>	Ermitaño canelo			0-1000		X			X	X	X	X
<i>Threnetes ruckeri</i>	Ermitaño barbudo			0-1050		X					X	X
<i>Phaethornis strii-gularis</i>	Ermitaño gorgiestriado			0-1200*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Phaethornis anthophilus</i>	Ermitaño carinegro			0-1500*						X	X	X
<i>Phaethornis guy</i>	Ermitaño verde			900-2000	X	X		X	X	X	X	X
<i>Phaethornis symmatophorus</i>	Ermitaño leonado			800-2400	X	X	X	X	X	X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Phaethornis longirostris</i>	Ermitaño rabudo occidental			0-1050				X	X	X	X	X
<i>Androdon aequatorialis</i>	Colibrí dentado		REST	1400-2700						X	X	X
<i>Doryfera ludovicae</i>	Pico de lanza frentiverde			0-200	X	X		X	X	X	X	
<i>Campylopterus falcatius</i>	Ala de sable violeta			500-2600*		X			X			
<i>Florisuga mellivora</i>	Colibrí collarejo			0-1600	X			X	X	X		X
<i>Colibri delphinae</i>	Chillón pardo			100-2200		X						X
<i>Colibri thalassinus</i>	Chillón verde			600-2800	X	X	X	X	X	X		
<i>Colibri coruscans</i>	Chillón común			1300-3600	X	X	X	X	X	X		
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mango pechinero			0-1750	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Cabeza de rubí			0-1750			X		X			
<i>Klais guimeti</i>	Cuatro ojos violeta			400-1450						X	X	
<i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>	Esmeralda coliazul occidental		REST	1000-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Chlorostilbon gibsoni</i>	Esmeralda piquirroja		REST	0-500				X				
<i>Thalurania fannyi</i>	Ninfa coripúrpura			0-1200*						X	X	X
<i>Damophila julie</i>	Damófila pechiverde			0-1750							X	X
<i>Lepidopygia goudoti</i>	Colibrí de Goudot			0-1600	X					X		
<i>Amazilia tzacatl</i>	Amazilia colirrufo			0-1800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Amazilia franciae</i>	Amazilia andino			1000-2000	X	X		X		X	X	
<i>Amazilia amabilis</i>	Amazilia pechiazul			0-1000		X				X	X	X
<i>Amazilia saucerrottei</i>	Amazilia coliazul			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Chalybura buffonii</i>	Colibrí de Buffon			0-2000		X	X		X			
<i>Chalybura urochrysa</i>	Colibrí colibrón			0-900			X				X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Adelomyia melano-genys</i>	Colibrí pechi-punteado			1000-2500	X		X	X	X	X		
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	Heliodoxa leonado			1800-2600					X			
<i>Heliodoxa jacula</i>	Heliodoxa rabiazul			500-1500	X					X	X	X
<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	Heliodoxa coronado			1300-2400						X		
<i>Urochroa bougueri</i>	Colibrí nagui-blanco			1500-2500	X							
<i>Boissonneaua flavescens</i>	Colibrí chupa-savia			1400-2800	X			X	X	X		
<i>Aglaeactis cupripennis</i>	Colibrí paramuno			2900-3400	X		X		X			
<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	Colibrí terciopelo			1500-3700	X		X		X			
<i>Coeligena coeligena</i>	Inca bron-cineo			1500-2600	X	X		X	X	X	X	
<i>Coeligena torquata</i>	Inca collarejo			1500-3000	X			X	X	X		
<i>Coeligena orina</i>	Inca de Frontino	EN	LOC	3200	X							
<i>Ensifera ensifera</i>	Pico de sable			1700-3300	X					X		
<i>Heliangelus exortis</i>	Heliángelus bellicoso			1500-3400	X		X	X	X	X		
<i>Eriocnemis vestita</i>	Paramero esmeraldino			2250-3850	X							
<i>Eriocnemis derbyi</i>	Paramero rabihorcado	NT	REST	2500-3600						X		
<i>Haplophaedia aureliae</i>	Helechero común			1500-3100	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Ocreatus underwoodii</i>	Cola de raqueta			1500-2500	X	X		X	X	X	X	
<i>Ramphomicron microrhynchum</i>	Pico de tuna morado			1700-3400	X					X		
<i>Metallura tyrianthina</i>	Metalura colirrojo			1700-3600	X		X	X	X			
<i>Metallura williami</i>	Metalura verde			2100-3800						X		
<i>Agelaiocercus kingi</i>	Silfo coliverde			1400-3000	X			X	X	X		
<i>Agelaiocercus coelestis</i>	Silfo violeta		REST	300-2100	X							
<i>Schistes geoffroyi</i>	Pico de cuña			0-1000			X	X		X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Heliophryx barroti</i>	Hadita coliblanca			0-1000		X				X	X	X
<i>Heliomaster longirostris</i>	Picudo coronado			0-1500	X	X	X		X	X		
<i>Calliphlox mitchellii</i>	Zumbador pechiblanco		REST	0-1900	X	X				X		X
<i>Chaetocercus mulsant</i>	Zumbador ventriblanco			1500-2800	X	X	X	X	X		X	
<i>Chaetocercus heliodor</i>	Zumbador diminuto			500-2800		X	X			X		
ORDEN TROGONIFORMES												
Familia Trogonidae												
<i>Trogon viridis</i>	Trogón coliblanco			0-1200							X	X
<i>Trogon violaceus</i>	Trogón violáceo			0-1000							X	X
<i>Trogon collaris</i>	Trogón collarito			400-2000	X		X	X	X	X		X
<i>Trogon personatus</i>	Trogón enmascarado			700-2100	X	X		X	X	X	X	
<i>Trogon rufus</i>	Trogón esmeralda			0-1100							X	X
<i>Trogon comptus</i>	Trogón ojiblanco		REST	0-1800						X		
<i>Trogon melanurus</i>	Trogón colinegro			0-2200					X		X	X
<i>Pharomachrus auriceps</i>	Quetzal colinegro			1400-2700	X			X	X	X	X	
<i>Pharomachrus antisianus</i>	Quetzal crestado			1400-2800	X				X			
ORDEN CORACIIFORMES												
Familia Alcedinidae												
<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador mayor			0-2600		X	X	X	X	X	X	X
<i>Megaceryle alcyon</i>	Martín pescador migratorio			Migratorio							X	X
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín pescador matraquero			0-1200		X	X		X	X	X	X
<i>Chloroceryle americana</i>	Martín pescador chico			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Chloroceryle aenea</i>	Martín pescador pigmeo			0-2600*								X
Familia Momotidae												
<i>Hylomanes motula</i>	Barranquero colimocho			0-1500						X		
<i>Electron platyrhynchum</i>	Barranquero platyrhynchum			0-1100							X	X
<i>Baryphthengus martii</i>	Barranquero canelo			0-1000						X	X	X
<i>Momotus aequatorialis</i>	Barranquero coronado			0-1300	X	X	X	X	X	X		
ORDEN GALBULIFORMES												
Familia Galbulidae												
<i>Brachygalba salmoni</i>	Jacamar de Salmon			0-600						X		
<i>Galbula ruficauda</i>	Jacamar colirrufo			0-1300				X			X	X
<i>Jacamerops aureus</i>	Gran Jacamar			0-900								X
Familia Bucconidae												
<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	Bobo cuelli-blanco			0-500							X	X
<i>Notharchus pectoralis</i>	Bobo pechiniegro			0-1000							X	X
<i>Notharchus tectus</i>	Bobo coronado			0-500							X	X
<i>Nystalus radiatus</i>	Bobo barrado			0-900							X	X
<i>Hypnelus ruficollis</i>	Bobo punteado			0-1200				X			X	X
<i>Malacoptila panamensis</i>	Bigotudo dormilón			0-900						X	X	X
<i>Malacoptila mystacalis</i>	Bigotudo canoso			800-2100	X	X	X	X		X	X	
<i>Micromonacha lanceolata</i>	Bigotudo lanceolado			300-2100							X	
<i>Nonnula frontalis</i>	Monjita canela			0-1000							X	X
<i>Monasa morphoeus</i>	Monjita cantora			0-1100							X	X
ORDEN PICIFORMES												
Familia Capitonidae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Capito maculicoronatus</i>	Torito cabeciblanco			0-1000								X
<i>Capito hypoleucus</i>	Torito capiblanco	EN	NAL	200-1500		X				X	X	X
<i>Eubucco bourcierii</i>	Torito cabecirrojo			400-2400*	X	X	X	X	X	X	X	
Familia Ramphastidae												
<i>Ramphastos ambiguus</i>	Tucán dios-tedé			100-2400				X		X	X	X
<i>Ramphastos vitellinus</i>	Tucán limón			0-900							X	X
<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	Tucancito esmeralda			1600-3700*	X	X	X	X	X	X		
<i>Aulacorhynchus haematopygus</i>	Tucancito rabirrojo			300-2100*		X				X	X	
<i>Andigena nigrirstris</i>	Terlaque andino	NT		1600-3200	X	X		X	X	X		
<i>Selenidera spectabilis</i>	Pichilingo negro			0-1500						X		
<i>Pteroglossus torquatus</i>	Pichí collarejo			0-800					X	X	X	X
Familia Picidae												
<i>Picumnus olivaceus</i>	Carpinterito oliváceo			0-2500*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Picumnus grandidensis</i>	Carpinterito punteado		NAL	800-2100	X	X	X	X				
<i>Melanerpes formicivorus</i>	Carpintero de los robles			1400-3300	X	X	X	X	X	X		
<i>Melanerpes pulcher</i>	Carpintero bonito	VU	NAL	400-1400*						X	X	X
<i>Melanerpes pucherani</i>	Carpintero de antifaz			0-400						X	X	
<i>Melanerpes rubricapillus</i>	Carpintero habado			0-1700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Veniliornis dignus</i>	Carpintero ventriamarillo			700-2700*				X		X		
<i>Veniliornis nigriceps</i>	Carpintero paramuno			2800-3600						X		
<i>Veniliornis fumigatus</i>	Carpintero ahumado			600-2800*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Veniliornis kirkii</i>	Carpintero rabirrojo			0-1300		X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Piculus leucolaemus</i>	Carpintero bigotudo			100-1400							X	X
<i>Piculus chrysochloros</i>	Carpintero dorado			0-500								X
<i>Piculus rubiginosus</i>	Carpintero cariblanco			900-3100		X	X	X	X	X	X	X
<i>Piculus rivolii</i>	Carpintero carmesí			1800-3500*	X	X	X	X	X	X		
<i>Colaptes punctigula</i>	Carpintero buchipecoso			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Celeus loricatus</i>	Carpintero canelo			0-1500						X	X	X
<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero real			0-2100	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Campephilus pollens</i>	Carpintero gigante			900-3600	X				X	X		
<i>Campephilus haemastogaster</i>	Carpintero selvático			0-1100								X
<i>Campephilus melanoleucos</i>	Carpintero marcial			0-3100		X		X		X	X	X
ORDEN PASSERIFORMES												
Familia Furnariidae												
<i>Cinclodes excelsior</i>	Cíncloides cavador		LOC	Más 3300						X		
<i>Furnarius leucopus</i>	Hornero patiamarillo			0-500							X	X
<i>Leptasthenura andicola</i>	Coludito frailejonero			3000-4500	X					X		
<i>Schizoeaca fuliginosa</i>	Rastrojero andino			2300-2600	X					X		
<i>Synallaxis azarae</i>	Rastrojero de Azara			900-3000*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Synallaxis albescens</i>	Rastrojero pálido			0-2100	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Synallaxis unirufa</i>	Rastrojero de antifaz			1700-3100	X				X			
<i>Synallaxis brachyura</i>	Rastrojero pizarra			0-2000		X		X		X		
<i>Hellmayrea gularis</i>	Rastrojero cejiblanco			2400-3800					X			
<i>Cranioleuca erythrops</i>	Rastrojero rubicundo			1000-2100	X	X		X		X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Certhiax cinnamomeus</i>	Rastrojero barbiamarillo			0-500								X
<i>Asthenes flammulata</i>	Canastero flamulado			2800-4200						X		
<i>Xenerpestes minlosi</i>	Trapezista gris			0-900								X
<i>Premnornis gutturaligera</i>	Corretroncos alirrojo			1600-2500	X	X		X	X			
<i>Premnoplex brunescens</i>	Corretroncos barranquero			1200-2600	X			X	X	X	X	
<i>Margarornis stellatus</i>	Corretroncos barbiblanco	NT	REST	1200-2200	X					X		
<i>Margarornis squamiger</i>	Corretroncos perlado			1500-3000	X			X	X	X		
<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>	Corretroncos cuelliblanco			1800-3200	X			X	X			
<i>Anabacerthia striatocollis</i>	Hojasquero montañero			1000-2400	X	X		X		X	X	
<i>Syndactyla subalaris</i>	Hojasquero listado			900-2400*		X				X	X	
<i>Hylocistis subulatus</i>	Hojasquero estriado			0-900	X					X	X	X
<i>Philydor fuscipenne</i>	Hojasquero alinegro			0-1200						X	X	X
<i>Philydor rufum</i>	Hojasquero ocráceo			900-1800	X					X	X	
<i>Thripadectes ignobilis</i>	Hojasquero uniforme		REST	200-2500	X							
<i>Thripadectes holotictus</i>	Hojasquero menor			1800-2700	X	X		X	X			
<i>Thripadectes virgaticeps</i>	Hojasquero común			1200-2500	X				X	X	X	
<i>Thripadectes flammulatus</i>	Hojasquero rayado			800-3000*	X			X				
<i>Automolus ochrolaemus</i>	Hojasquero oliváceo			0-1200							X	X
<i>Automolus rubiginosus</i>	Hojasquero canela			0-1800						X	X	
<i>Sclerurus mexicanus</i>	Raspahojas picudo			0-2000							X	XX
<i>Sclerurus guatemalensis</i>	Raspahojas medialuna			0-900						X	X	X
<i>Xenops minutus</i>	Xenops pardusco			0-1800	X	X		X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Xenops rutilans</i>	Xenops estriado			1500-2800	X	X		X	X	X		X
<i>Dendrocicla tyrannina</i>	Trepador cordillerano			1500-3000	X	X			X	X		
<i>Dendrocicla fuliginosa</i>	Trepador pardo			0-1500			X			X	X	X
<i>Deconychura longicauda</i>	Trepador rabilargo			0-1300			X					
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepador oliváceo			0-1000						X	X	X
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Trepador pico de cuña			0-2100			X			X	X	X
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Trepador gigante			100-3000	X				X	X	X	X
<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>	Trepador barrado norteño			0-1200*							X	X
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepador rayado			1300-2800	X		X		X			
<i>Xiphorhynchus picus</i>	Trepador pico de lanza			0-600		X		X			X	X
<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	Trepador cacaotero			0-1100*	X	X	X	X			X	X
<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i>	Trepador lacrimoso			0-1500								X
<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	Trepador manchado			0-2100*						X	X	
<i>Xiphorhynchus triangularis</i>	Trepador perlado			800-2700*	X	X		X	X	X	X	
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	Trepador campestre			0-1500	X	X	X	X		X	X	X
<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	Trepador montañoso			1800-3000	X	X	X	X	X	X		
<i>Campylorhamphus trochilrostris</i>	Guadagnero rojizo			0-1700*					X	X	X	X
<i>Campylorhamphus pusillus</i>	Guadagnero estriado			300-2100	X			X	X	X		
Familia Thamnophilidae												
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Batará capirozado			0-900							X	X
<i>Taraba major</i>	Batará mayor			0-1800*		X					X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Sakesphorus canadensis</i>	Batará copetón			0-400							X	X
<i>Thamnophilus doliatus</i>	Batará barrado			0-1500			X		X		X	X
<i>Thamnophilus multistriatus</i>	Batará cargajada		REST	400-2200*	X	X	X	X	X	X		
<i>Thamnophilus nigriceps</i>	Batará negro			0-600							X	X
<i>Thamnophilus unicolor</i>	Batará unicolor			1400-2300	X	X		X	X	X	X	
<i>Thamnophilus atrinucha</i>	Batará plomizo occidental			0-500			X			X	X	X
<i>Clytoctantes alixii</i>	Hormiguero pico de hacha	EN	REST	180-1000								X
<i>Thamnistes anabatinus</i>	Hormiguero bermejo			0-1500								X
<i>Dysithamnus mentalis</i>	Hormiguero tiznado			300-2200*		X	X			X	X	
<i>Dysithamnus puncticeps</i>	Hormiguero cabecipunteado			0-1000	X							
<i>Dysithamnus occidentalis</i>	Hormiguero occidental	VU		900-2650	X							
<i>Myrmotherula fulviventrís</i>	Hormiguerito barbiescarnado			0-2000						X	X	X
<i>Myrmotherula brachyura</i>	Hormiguerito pigmeo			0-900								X
<i>Myrmotherula pacífica</i>	Hormiguerito del Pacífico			0-1100*							X	X
<i>Myrmotherula axillaris</i>	Hormiguerito flañquiblanco			0-900							X	X
<i>Myrmotherula schisticolor</i>	Hormiguerito pizarroso			400-2100*			X			X	X	
<i>Herpsilochmus axillaris</i>	Hormiguerito pechiamarillo			900-1800							X	
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Hormiguerito alirrufo			100-1200						X		X
<i>Microrhopias quixensis</i>	Hormiguerito abanico			0-900						X	X	X
<i>Formicivora grisea</i>	Hormiguerito pechinegro			0-1100			X			X	X	X
<i>Drymophila caudata</i>	Hormiguerito rabilargo			600-2700*	X	X		X	X		X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Terenura callinota</i>	Hormiguerito rabibermejo			800-2400						X	X	
<i>Cercomacra tyrannina</i>	Hormiguero negruzco			0-2100	X						X	X
<i>Cercomacra parkeri</i>	Hormiguero de Parker			1800-1900*	X			X		X	X	X
<i>Cercomacra nigricans</i>	Hormiguero yegué			0-500								X
<i>Gymnocichla nudiceps</i>	Hormiguero calvo			0-400						X	X	X
<i>Myrmeciza longipes</i>	Hormiguero pechiblanco			0-1700						X		
<i>Myrmeciza exsul</i>	Hormiguero dorsicastaño			0-900						X	X	X
<i>Myrmeciza laemoticta</i>	Hormiguero alimanchado			0-1100							X	
<i>Myrmeciza immaculata</i>	Hormiguero immaculado			100-2000		X				X	X	
<i>Myrmornis torquata</i>	Gallito selvático			900						X		X
<i>Gymnophrys leucaspis</i>	Hormiguero bicolor			0-450							X	X
<i>Hylophylax naevioides</i>	Hormiguerito collarejo			0-900							X	X
<i>Phaenostictus mcleannani</i>	Hormiguero ocelado			0-900								X
Familia Formicariidae												
<i>Formicarius analis</i>	Gallito carinero			0-1000						X	X	X
<i>Formicarius rufpectus</i>	Gallito pechirrojo			1100-2200						X	X	
<i>Grallaria alleni</i>	Tororoi bigotudo	EN	NAL	2100					X			
<i>Grallaria guatemalensis</i>	Tororoi dorsiescamado			300-2000				X	X			
<i>Grallaria ruficapilla</i>	Tororoi compapán			1200-2800	X	X	X	X	X	X		
<i>Grallaria rufocinerea</i>	Tororoi rufo-cenizo	VU	REST	2100-3100					X	X		
<i>Grallaria nuchalis</i>	Tororoi chusquero			2200-3000	X			X	X			
<i>Grallaria flavotincta</i>	Tororoi rufoamarillo		REST	1300-1800	X							

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Grallaria hypoleuca</i>	Tororoi pechi-blanco			1500-2100	X				X	X	X	
<i>Grallaria rufula</i>	Tororoi flautista			2400-3600	X							
<i>Grallaria quitensis</i>	Tororoi leonado			2200-3700						X		
<i>Hylopezus perspicillatus</i>	Tororoi de anteojos			0-1200							X	
<i>Hylopezus fulviventris</i>	Tororoi ventri-canelo			0-900							X	
<i>Grallaria flavirostris</i>	Tororoi piquigualdo			500-2100						X	X	
<i>Grallaria cucullata</i>	Tororoi cabe-cirrufo	NT	REST	1500-2700					X			
<i>Grallaria nana</i>	Tororoi enano			1300-2100*	X			X	X			
Familia Conopophagidae												
<i>Conopophaga castaneiceps</i>	Zumbador pechigris			1200-1800	X					X	X	
Familia Rhinocryptidae												
<i>Myornis senilis</i>	Tapaculo cenizo			2400-3100				X	X			
<i>Scytalopus latrans</i>	Tapaculo negruzco			1700-3300*	X			X	X	X		
<i>Scytalopus atratus</i>	Tapaculo coroniblanco			1200-3100 *	X					X	X	
<i>Scytalopus stilesi</i>	Tapaculo de Stiles		NAL	1900-3500 *				X		X	X	
<i>Scytalopus vicini</i>	Tapaculo de Nariño		REST	450-3700	X							
<i>Scytalopus spillmanni</i>	Tapaculo de Spillmann			1700-3600*	X	X		X				
<i>Scytalopus canus</i>	Tapaculo paramuno			2500-3200*	X							
<i>Acropternis orthonyx</i>	Tapaculo ocelado			2700-3000	X			X	X			
Familia Tyrannidae												
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	Tiranuelo capigrís			0-1000*		X				X	X	X
<i>Phyllomyias nigrocapillus</i>	Tiranuelo capinegro			1600-3400*	X	X			X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Phyllomyias cinereiceps</i>	Tiranuelo cenizo			1800-2700				X	X	X	X	
<i>Phyllomyias plumbeiceps</i>	Tiranuelo plumizo			1300-2200	X				X	X	X	
<i>Tyrannulus elatus</i>	Tiranuelo coronado			0-1000		X			X	X	X	X
<i>Myiopagis gaimardii</i>	Elaenia selvática			0-600							X	X
<i>Myiopagis caniceps</i>	Elaenia gris			0-900*							X	
<i>Myiopagis viridicata</i>	Elaenia verdosa			0-1300			X					X
<i>Elaenia flavogaster</i>	Elaenia copetona			0-2100	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Elaenia chiriquensis</i>	Elaenia menor			0-2200		X			X	X	X	X
<i>Elaenia frantzii</i>	Elaenia montañera			1600-2500	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Ornithion brunnei-capillus</i>	Tiranuelo cejón			0-600							X	X
<i>Camptostoma obsoletum</i>	Tiranuelo silbador			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Mecocerculus poecilocercus</i>	Tiranuelo coliblanco			1600-2700	X			X				
<i>Mecocerculus stictopterus</i>	Tiranuelo colilargo			1800-3600						X		
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	Tiranuelo gorgiblanco			2600-3400			X		X	X		
<i>Serpophaga cinerea</i>	Tiranuelo saltarroyo			100-3200	X			X	X	X		
<i>Phaeomyias murina</i>	Tiranuelo murino			0-1700*		X			X			X
<i>Capsiempis flaveola</i>	Tiranuelo amarillo			0-500						X	X	X
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	Doradito lagunero	VU		1500-2600*					X			X
<i>Pseudotriccus pelzelni</i>	Tiranuelo bronce-oliva			700-2500						X		
<i>Pseudotriccus ruficeps</i>	Tiranuelo colorado			400-3600	X				X			
<i>Zimmerius chrysops</i>	Tiranuelo suelderito			300-2400*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Phylloscartes poecilotis</i>	Atrapamoscas variegado			1500-2300	X	X		X				

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Phylloscartes ophthalmicus</i>	Atrapamoscas marmorado			600-2400*	X	X		X		X	X	
<i>Phylloscartes lanyoni</i>	Tiranuelo antioqueño	EN	NAL	0-750						X		X
<i>Phylloscartes supercilialis</i>	Tiranuelo de visera			1700						X	X	
<i>Mionectes striatocollis</i>	Mionectes estriado			1600-2700	X	X	X	X	X	X		
<i>Mionectes olivaceus</i>	Mionectes oliváceo			0-2400*	X	X				X	X	X
<i>Mionectes oleagineus</i>	Mionectes ocráceo			0-1700		X	X	X	X	X	X	X
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Atrapamoscas sepia			0-600							X	X
<i>Leptopogon supercilialis</i>	Atrapamoscas orejinegro			120-2100	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Leptopogon rufipectus</i>	Atrapamoscas pechirrufo		REST	1600-2700	X			X	X			
<i>Myiobittacus ornatus</i>	Atrapamoscas ornado			400-2300*						X	X	
<i>Myiornis atricapillus</i>	Tiranuelo capuchinegro			0-900							X	X
<i>Oncostoma olivaceum</i>	Pico de gancho oliváceo			0-1000						X	X	X
<i>Lophotriccus pileatus</i>	Tiranuelo pileado			300-2300						X	X	
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Picochato perlado			0-1100							X	X
<i>Hemitriccus granaeensis</i>	Picochato carinegro			1500-3100*	X			X	X			
<i>Poecilatriccus ruficeps</i>	Tiranuelo capirrufo			1000-2700*	X			X	X	X		
<i>Poecilatriccus sylvia</i>	Espatullilla rastrojera			0-1100		X	X	X		X	X	
<i>Todirostrum cinereum</i>	Espatullilla común			0-1900	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Todirostrum nigriceps</i>	Espatullilla cabecinegra			0-1100							X	X
<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	Atrapamoscas zumbador			0-1200						X	X	X
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Picoplano oliváceo			0-600	X						X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>	Picoplano pectoral			200-2100*					X	X	X	
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Picoplano azufrado			0-1800		X	X	X	X		X	X
<i>Tolmomyias assimilis</i>	Picoplano aliamarillo			0-800						X		
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Picoplano pechiamarillo			0-500							X	
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Pico de pala pechiamarillo			900-2000	X					X	X	
<i>Platyrinchus coronatus</i>	Pico de pala coronado			0-900							X	
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Atrapamoscas real			0-1200								X
<i>Myiophobus flavicans</i>	Atrapamoscas amarillento			1500-2700		X		X	X	X		
<i>Myiophobus phoenicomitra</i>	Atrapamoscas cabeza de hierro			0-1100							X	
<i>Myiophobus pulcher</i>	Atrapamoscas musguero			1800-2600				X	X	X		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	Atrapamoscas pechirrayado			600-2600*		X	X	X	X	X	X	X
<i>Myiobius villosus</i>	Atrapamoscas leonado			800-2100						X	X	
<i>Myiobius barbatus</i>	Atrapamoscas rabiamarillo			0-1000				X				
<i>Myiobius atricaudus</i>	Atrapamoscas colinegro			0-1400							X	X
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Atrapamoscas colirrufo			0-900							X	X
<i>Pyrrhomyias cinnamomea</i>	Atrapamoscas canela			600-3100	X	X	X	X	X	X		
<i>Aphanotriccus audax</i>	Atrapamoscas piconegro	NT	REST	100-600						X		
<i>Empidonax virescens</i>	Atrapamoscas verdoso			0-2700		X		X	X			
<i>Empidonax traillii</i>	Atrapamoscas de Traill			0-2600*		X			X			
<i>Empidonax alnorum</i>	Atrapamoscas alisero			0-2600*					X			
<i>Contopus cooperi</i>	Atrapamoscas boreal			0-3300		X	X	X	X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Contopus fumigatus</i>	Atrapamoscas sombrío			300-3000	X		X	X	X	X	X	
<i>Contopus sordidulus</i>	Atrapamoscas occidental			0-2600		X			X			
<i>Contopus virens</i>	Atrapamoscas oriental			0-2700	X	X	X	X	X	X		X
<i>Contopus cinereus</i>	Atrapamoscas tropical			0-2600*		X						X
<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	Atrapamoscas moñudo			100-1200						X		
<i>Sayornis nigricans</i>	Atrapamoscas gallinacito			100-2800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Atrapamoscas pechirrojo			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Knipolegus poecilurus</i>	Atrapamoscas ojirrojo			1600-3100	X	X		X	X		X	
<i>Muscisaxicola alpinus</i>	Dormilona cenicienta			3300-4200						X		
<i>Myiotheretes straticollis</i>	Atrapamoscas chiflaperros			1500-3600	X		X	X	X	X		
<i>Myiotheretes fumigatus</i>	Atrapamoscas tiznado			1800-3600					X			
<i>Fluvicola pica</i>	Viudita común			0-1000							X	X
<i>Arundinicola leucocephala</i>	Monjita pantanera			0-500							X	X
<i>Ochthoeca frontalis</i>	Pitajo coronado			1300-3600						X		
<i>Ochthoeca diadema</i>	Pitajo de diadema			1700-3100	X			X	X	X		
<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	Pitajo torrentero			900-3000/	X			X	X	X		
<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	Pitajo pechirrufo			2000-3600	X			X	X	X		
<i>Ochthoeca fumicolor</i>	Pitajo ahumado			1800-3600	X		X	X	X	X		
<i>Colonia colonus</i>	Atrapamoscas rabijunco			0-1800							X	X
<i>Machetornis rixosa</i>	Atrapamoscas ganadero			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Legatus leucophaeus</i>	Atrapamoscas pirata			0-1700		X	X	X	X	X	X	
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Suelda crestinegra			0-2100*	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Myiozetetes similis</i>	Suelda social			0-800		X			X		X	X
<i>Myiozetetes grandidensis</i>	Suelda capigris			0-1500							X	X
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bichofué gritón			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Pitangus lictor</i>	Bichofué menor			0-500	X				X		X	
<i>Conopias albobittatus</i>	Suelda del Chocó			0-600							X	
<i>Conopias cinchoneti</i>	Suelda limón			400-2100*						X		
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	Atrapamoscas lagartero			400-2400*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Atrapamoscas sulfurado			400-2600		X			X		X	
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Atrapamoscas maculado			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Megarynchus pitangua</i>	Atrapamoscas picudo			0-1400	X						X	X
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Sirirí común			0-2700*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Tyrannus savana</i>	Sirirí tijereta			0-2600	X	X			X	X	X	X
<i>Tyrannus tyrannus</i>	Sirirí migratorio			0-2600	X	X		X	X		X	
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Sirirí gris			0-3000*					X		X	X
<i>Rhytipterna holerythra</i>	Plaíndera rufa			0-1000						X	X	X
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Atrapamoscas capinegro			0-2400*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Myiarchus panamensis</i>	Atrapamoscas panameño			0-600					X		X	
<i>Myiarchus apicalis</i>	Atrapamoscas apical		NAL	400-2300	X	X	X	X	X	X		
<i>Myiarchus cephalotes</i>	Atrapamoscas montañero			1500-2700*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Myiarchus crinitus</i>	Atrapamoscas copetón			0-1100		X	X		X		X	
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Atrapamoscas crestado			0-1000		X					X	X
<i>Attila spadiceus</i>	Atila lomiamarilla			0-2100					X	X	X	X
Familia Oxyruncidae												
<i>Oxyruncus cristatus</i>	Picoagudo			1300-3250*						X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Familia Cotingidae												
<i>Ampelion rubrocrissatus</i>	Cotinga crestada			2200-3700	X			X	X	X		
<i>Ampelion rufaxilla</i>	Cotinga alirrufa	NT		1900-2700	X				X			
<i>Pipreola riefferii</i>	Frutero verdinegro			900-2700*	X	X	X	X	X	X		
<i>Pipreola arcuata</i>	Frutero barrado			900-3100*	X					X		
<i>Pipreola aureopectus</i>	Frutero pechidorado			1300-2300	X	X				X	X	
<i>Ampelioides tschudii</i>	Frutero escamado			650-2700							X	
<i>Rupicola peruviana</i>	Gallo de roca andino			500-2400*	X	X						
<i>Cotinga nattererii</i>	Cotinga azul			0-1000						X	X	
<i>Lipaugus weberi</i>	Arriero antioqueño	CR	LOC	150-1820						X	X	
<i>Lipaugus fuscocinnereus</i>	Arriero cenizo			2000-3000	X							
<i>Lipaugus unirufus</i>	Arriero rufo			0-1000							X	X
<i>Querula purpurata</i>	Cuaba			0-1200						X	X	X
<i>Pyroderus scutatus</i>	Toropisco			1600-2900	X				X	X		
Familia Pipridae												
<i>Masius chrysopterus</i>	Saltarín moñudo			500-2300*	X					X		
<i>Corapipo leucorrhoa</i>	Saltarín gorgiblanco			200-1500								X
<i>Machaeropterus regulus</i>	Saltarín rayado			0-1500		X		X	X	X	X	X
<i>Lepidothrix coronata</i>	Saltarín coronado			0-1400							X	X
<i>Manacus manacus</i>	Saltarín barbiblanco			0-1900		X			X	X	X	X
<i>Xenopipo holochlora</i>	Saltarín verde			0-1300*						X		X
<i>Xenopipo flavicapilla</i>	Saltarín dorado	NT	REST	1200-2400	X	X		X	X			
<i>Pipra pipra</i>	Saltarín cabe-ciblanco			600-1600	X					X	X	X
<i>Pipra erythrocephala</i>	Saltarín cabe-cidorado			0-500						X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Tityra inquisitor</i>	Tityra capirotada			0-800							X	
<i>Tityra semifasciata</i>	Tityra enmascarada			0-1700					X	X	X	X
<i>Schiffornis turdina</i>	Saltarín turdino			0-1400							X	X
<i>Laniocera rufescens</i>	Plañidera manchada			0-1000							X	X
<i>Pachyramphus versicolor</i>	Cabezón barrado			1600-2600	X	X		X	X			
<i>Pachyramphus rufus</i>	Cabezón cinereo			0-1500		X	X	X	X	X	X	X
<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>	Cabezón canelo			0-1300		X	X	X	X		X	X
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Cabezón aliblanco			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Pachyramphus homochrous</i>	Cabezón carbonero			0-900							X	
<i>Piprites chloris</i>	Piprites alibarrado			0-1500						X	X	X
Familia Sapayoidae												
<i>Sapayoa aenigma</i>	Sapayoa			0-1100						X	X	X
Familia Vireonidae												
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Verderón cejirrufo			0-1800					X	X		X
<i>Cyclarhis nigrrostris</i>	Verderón piquinegro			1600-2700	X	X	X	X	X	X		
<i>Vireolanius eximius</i>	Verderón cejiamarillo		REST	100-1500*						X	X	X
<i>Vireolanius leucotis</i>	Verderón real			300-2100	X							
<i>Vireo flavifrons</i>	Verderón cariamarillo			0-2700*		X	X	X	X	X		X
<i>Vireo leucophrys</i>	Verderón montañero			1200-2800	X	X	X	X	X	X		
<i>Vireo philadelphicus</i>	Verderón de Philadelphia			0-1200				X	X			
<i>Vireo olivaceus</i>	Verderón ojirrojo			0-3600		X	X	X	X	X	X	X
<i>Vireo flavoviridis</i>	Verderón verdeamarilloso			1600-1700*					X			
<i>Vireo altiloquus</i>	Verderón canoro			0-1200								X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Hylophilus semibrunneus</i>	Verderón castaño			1000-2100	X	X		X		X	X	
<i>Hylophilus aurantiifrons</i>	Verderón luisucho			0-700								X
<i>Hylophilus flavipes</i>	Verderón rastrojero			0-1000					X	X	X	X
<i>Hylophilus decurtatus</i>	Verderón menor			0-500								X
Familia Corvidae												
<i>Cyanolyca armillata</i>	Urraca azul			1600-3100	X			X	X	X		
<i>Cyanocorax affinis</i>	Carriquí pechiblanco			0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Cyanocorax yncas</i>	Carriquí de montaña			900-3000*	X	X	X	X	X	X	X	
Familia Hirundinidae												
<i>Tachycineta albigaster</i>	Golondrina aliblanca			0-500						X	X	X
<i>Progne tapera</i>	Golondrina sabanera			0-3000						X	X	X
<i>Progne subis</i>	Golondrina púrpura			0-3100						X		
<i>Progne chalybea</i>	Golondrina de campanario			0-1200		X		X			X	X
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina azul y blanca			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Notiochelidon murina</i>	Golondrina ahumada			2100-3500	X				X	X		
<i>Neochelidon tibialis</i>	Golondrina selvática			0-1000		X				X	X	X
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina barranquera			0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Riparia riparia</i>	Golondrina riparia			0-3000	X	X						X
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijereta			0-2800		X	X	X	X			X
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Golondrina alfarera			0-3000					X			
Familia Troglodytidae												
<i>Microcerculus marginatus</i>	Cucarachero buscatono			0-1200						X	X	X
<i>Troglodytes aedon</i>	Cucarachero común			0-3400	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Troglodytes solstitialis</i>	Cucarachero montaraz			1500-3600	X			X	X	X		
<i>Cistothorus platensis</i>	Cucarachero paramuno			1400-4000*					X			
<i>Campylorhynchus zonatus</i>	Cucarachero matraquero			0-1600							X	X
<i>Campylorhynchus griseus</i>	Cucarachero chupahuevos			0-2100				X			X	X
<i>Thryothorus spadix</i>	Cucarachero cabecinegro		REST	400-1800*	X			X		X	X	
<i>Thryothorus fasciatoventris</i>	Cucarachero ventrinegro			0-1000				X			X	X
<i>Thryothorus mystacalis</i>	Cucarachero bigotudo			1000-2800	X	X		X	X	X		
<i>Thryothorus nigricapillus</i>	Cucarachero selvático			0-1800	X				X	X	X	X
<i>Thryothorus leucopogon</i>	Cucarachero chocoano			0-900							X	
<i>Thryothorus leucotis</i>	Cucarachero anteadado			0-600			X					X
<i>Cinnycerthia unirufa</i>	Cucarachero rufo			2200-3800				X	X	X		
<i>Cinnycerthia olivaceus</i>	Cucarachero sepia			900-3100*				X	X		X	
<i>Henicorhina leucosticta</i>	Cucarachero pechiblanco			0-1000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Henicorhina leucophrys</i>	Cucarachero pechigrís			1000-2900	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Henicorhina negreti</i>	Cucarachero de Munchique			2200-2400*	X							
<i>Cyphorhinus thoracicus</i>	Cucarachero flautista			00-2600	X					X		
<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i>	Cucarachero gaitero			0-1000							X	X
Familia Polioptilidae												
<i>Microbates cinereiventris</i>	Curruca rubicunda			0-1000*								X
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Curruca picuda			0-1500		X			X	X	X	X
<i>Polioptila plumbea</i>	Curruca tropical			0-1600	X	X	X	X				X
<i>Polioptila schistaceigula</i>	Curruca pizarra			0-1000							X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Donacobius atricapilla</i>	Sinsonte lagunero			0-500					X	X	X	X
Familia Cinclidae												
<i>Cinclus leucocephalus</i>	Mirlo acuático			100-3900	X	X		X	X	X		
Familia Turdidae												
<i>Myadestes ralloides</i>	Solitario andino			800-2700*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Catharus auranti-rostris</i>	Zorzal montuno			600-2200			X		X		X	
<i>Catharus fuscater</i>	Zorzal sombrío			600-2800				X		X		
<i>Catharus fuscescens</i>	Zorzal rojizo			0-2300				X	X			
<i>Catharus minimus</i>	Zorzal carigrís			0-2600						X	X	
<i>Catharus ustulatus</i>	Zorzal de Swainson			0-3000*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Platycichla leucops</i>	Mirra oji-blanca			900-2000*	X					X	X	
<i>Turdus fuscater</i>	Mirra común			1400-4100	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Turdus serranus</i>	Mirra serrana			1000-2800*	X	X		X	X	X		
<i>Turdus leucomelas</i>	Mirra ventri-blanca			0-1600		X				X	X	X
<i>Turdus ignobilis</i>	Mayo			0-2800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Turdus obsoletus</i>	Mirra selvática			0-1900		X				X	X	
<i>Turdus grayi</i>	Mirra parda			0-300		X	X	X				
Familia Mimidae												
<i>Mimus gilvus</i>	Sinsonte común	CARISM		0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Motacillidae												
<i>Anthus bogotensis</i>	Bisbita paramuna			3100-3600						X		
Familia Thraupidae												
<i>Schistochlamys melanopsis</i>	Pizarrita sabanera			0-1700					X	X		
<i>Sericossypha albocristata</i>	Pollo de monte			1600-3200	X		X	X				
<i>Nemosia pileata</i>	Trinadora pechiblanca			0-500								X
<i>Creurgops verticalis</i>	Buscaquiches rufo			1600-2700	X			X	X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Hemispingus atropileus</i>	Hemispingus cabecinegro			1800-3600	X			X	X			
<i>Hemispingus supercilialis</i>	Hemispingus cejiblanco			2100-3300	X			X	X	X	X	
<i>Hemispingus frontalis</i>	Hemispingus de antifaz			1500-2700	X	X		X	X	X		
<i>Hemispingus melanotis</i>	Hemispingus de antifaz			1700-2900	X				X			
<i>Hemispingus verticalis</i>	Hemispingus tiznado			3000-3600	X					X		
<i>Cnemoscopus rubrirostris</i>	Montero piquirrojo			2000-3300	X			X	X			
<i>Eucometis penicillata</i>	Güicha hormiguera			0-1700							X	X
<i>Tachyphonus luctuosus</i>	Parlotero aliblanco			0-2200				X		X	X	X
<i>Tachyphonus delatrii</i>	Parlotero de yelmo			0-1500						X		X
<i>Tachyphonus rufus</i>	Parlotero malcasado			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	Toche sangretoro			0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Ramphocelus flammigerus</i>	Toche enjalmado			800-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo común			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Thraupis palmarum</i>	Verdulejo palmero			0-2600*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Thraupis cyanocephala</i>	Azulejo montañero			1400-3000	X	X	X	X	X	X		
<i>Bangsia melanochlamys</i>	Bangsia negra y oro	VU	NAL	1300-2450	X					X		
<i>Buthraupis montana</i>	Azulejo real			2200-3300	X				X			
<i>Buthraupis eximia</i>	Azulejo pechinegro			2000-3800	X							
<i>Anisognathus lacrymosus</i>	Clarínero lacrimoso			2000-3800	X			X	X			
<i>Anisognathus igniventris</i>	Clarínero escarlata			2400-3400	X			X				
<i>Anisognathus somptuosus</i>	Clarínero primavera			1400-2600	X	X	X	X	X	X		
<i>Chlorornis riefferii</i>	Clorornis patirrojo			1700-3300	X			X	X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Dubusia taeniata</i>	Dubusia diadema			2400-3600	X			X	X			
<i>Iridosomus porphyrocephalus</i>	Musguerito gargantilla	NT		750-2700*	X			X	X	X	X	
<i>Iridosomus rufivertex</i>	Musguerito paramuno			2300-3800	X				X			
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Viuvá de antifaz			900-3000*	X	X		X				
<i>Chlorochrysa phoenicotis</i>	Clorocrisa esmeralda		REST	700-2400			X			X		
<i>Chlorochrysa nitidissima</i>	Clorocrisa multicolor	VU	NAL	900-2000*	X					X		
<i>Tangara inornata</i>	Tangara cenicienta			0-1200		X		X	X	X	X	X
<i>Tangara arthus</i>	Tangara dorada			700-2500	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Tangara icterocephala</i>	Tangara amarilla			400-2100						X	X	
<i>Tangara xanthocephala</i>	Tangara coronada			1300-3100*	X	X	X	X	X		X	
<i>Tangara parzudakii</i>	Tangara parzudakii			700-2500*	X							
<i>Tangara guttata</i>	Tangara goteada			1000-1800	X					X	X	X
<i>Tangara gyrola</i>	Tangara lacrada			0-2100	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Tangara vitriolina</i>	Tangara rastrojera		REST	500-3000*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Tangara ruficervix</i>	Tangara diadema			1100-2400*	X	X	X	X			X	
<i>Tangara labradorides</i>	Tangara verde-plata			900-2400*	X	X	X	X	X	X		
<i>Tangara cyanicollis</i>	Tangara real			400-2400*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Tangara larvata</i>	Tangara collareja			0-1800				X		X	X	X
<i>Tangara nigroviridis</i>	Tangara berilina			900-3000	X	X		X	X	X	X	
<i>Tangara vassorii</i>	Tangara azul y negra			1900-3400	X		X	X	X	X	X	
<i>Tangara heinei</i>	Tangara capirota			700-2700	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Tersina viridis</i>	Azulejo golondrina			50-2100*		X	X		X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Dacnis lineata</i>	Dacnis carinera			0-1200			X	X	X	X	X	X
<i>Dacnis hartlaubi</i>	Dacnis turquesa	VU	NAL	300-2200*		X						
<i>Dacnis venusta</i>	Dacnis azul y negra			0-1100								X
<i>Dacnis cayana</i>	Dacnis azul			0-1000		X		X	X	X	X	X
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Mielero cerúleo			0-1400				X		X	X	X
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Mielero patirrojo			0-1100							X	
<i>Chlorophanes spiza</i>	Mielero verde			0-2300	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Heterospingus xanthopygius</i>	Chambergó cuernirrojo		REST	0-1100							X	X
<i>Hemithraupis guira</i>	Pintasillo güira			100-2000			X	X		X	X	X
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Pintasillo rabiamarillo			0-1000	X	X	X	X		X	X	
<i>Chrysothlypis salmóni</i>	Chococito escarlata		REST	0-1100*						X	X	
<i>Conirostrum sitticolor</i>	Conirostro encapuchado			2600-3700					X			
<i>Conirostrum albifrons</i>	Conirostro capiroto			1800-3000	X	X	X	X	X			
<i>Diglossa sittoides</i>	Diglosa canela			1500-3400	X	X		X	X	X		
<i>Diglossa gloriosissima</i>	Diglosa pechirrufo	EN	NAL	3000-3750	X							
<i>Diglossa lafresnayii</i>	Diglosa lustrosa			2000-3700		X			X	X		
<i>Diglossa humeralis</i>	Diglosa negra			2200-4000*						X		
<i>Diglossa brunneiventris</i>	Diglosa rabiazul			2000-3900					X	X		
<i>Diglossa albilatera</i>	Diglosa albilátera			1600-3100	X	X	X	X	X	X		
<i>Diglossa indigotica</i>	Diglosa chocoana		REST	700-2200	X					X		
<i>Diglossa caerulescens</i>	Diglosa azul			1700-3100	X	X		X	X	X		
<i>Diglossa cyanea</i>	Diglosa de antifaz			1800-3600	X	X	X	X	X	X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	Gorrión afelpado			2100-3300	X			X	X			
<i>Urothraupis stolzmanni</i>	Montero paramuno		LOC	3000-3600						X		
<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	Montero ojiblanco			1000-2700	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Chlorospingus flavigularis</i>	Montero gorgiamarillo			300-2000*	X			X		X	X	
<i>Chlorospingus canicularis</i>	Montero pectoral			1200-2600	X			X				
<i>Piranga flava</i>	Piranga bermeja			200-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Piranga rubra</i>	Piranga roja			0-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Piranga olivacea</i>	Piranga alinegra			0-2600		X	X	X	X	X		X
<i>Piranga rubriceps</i>	Piranga cabecirroja			1700-3000	X				X			
<i>Piranga leucoptera</i>	Piranga aliblanca			600-2200*	X					X	X	
<i>Habia gutturalis</i>	Habia cope-tona	NT	NAL	100-1100					X	X	X	X
<i>Habia cristata</i>	Habia ahumada		NAL	700-1800	X			X		X		
<i>Chlorothraupis olivacea</i>	Guayabero oliváceo		REST	0-1500							X	X
<i>Mitrospingus cassini</i>	Maraquera carisucia			0-1100							X	X
<i>Coereba flaveola</i>	Silga común			0-2000*	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Emberizidae												
<i>Tiaris olivaceus</i>	Semillero oliváceo			300-2300*	X	X	X	X	X	X		X
<i>Tiaris obscurus</i>	Semillero pardo			0-2100				X	X			X
<i>Tiaris bicolor</i>	Semillero pechinegro			0-1300	X				X		X	X
<i>Zonotrichia capensis</i>	Pinche copetón			150-3700	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Ammodramus humeralis</i>	Sabanero rayado			0-1000		X						
<i>Phrygilus unicolor</i>	Gorrión paramuno			2700-4500						X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Haplospiza rustica</i>	Gorrión pizarra			1200-2700*	X				X	X		
<i>Sicalis citrina</i>	Sicalis coliblanco			600-2800				X				X
<i>Sicalis flaveola</i>	Gorrión coronado			0-1000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Emberizoides herbicola</i>	Sabanero coludo			0-1800		X			X	X		
<i>Volatinia jacarina</i>	Volatinero negro			0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sporophila schistacea</i>	Espiguero pizarra			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sporophila intermedia</i>	Espiguero gris			0-2300	X	X	X		X	X	X	X
<i>Sporophila luctuosa</i>	Espiguero negriblanco			100-3200	X	X	X	X	X			X
<i>Sporophila nigricollis</i>	Espiguero capuchino			0-2300	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sporophila minuta</i>	Espiguero ladrillo			0-2300*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Oryzoborus funereus</i>	Curió picogordo			0-1600*		X	X		X	X	X	
<i>Oryzoborus crassirostris</i>	Curió renegrido			0-1000	X				X	X	X	X
<i>Catamenia inornata</i>	Semillero andino			2200-3800	X					X		
<i>Catamenia homochroa</i>	Semillero paramuno			2800-3800	X			X	X			
<i>Arremonops conirostris</i>	Pinzón conirrostró			0-1600	X	X	X		X	X	X	X
<i>Arremon aurantirostris</i>	Pinzón pico de oro			0-1800*					X	X	X	X
<i>Arremon brunnei-nucha</i>	Gorrión montes collaréjo			800-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Arremon torquatus</i>				1700-3600	X	X		X	X			
<i>Buarremon atricapillus</i>	Gorrión montes cabeceinegro			500-1500					X	X	X	X
<i>Oreothraupis arremonops</i>	Gorrión tanagrino	VU		1700-2500*	X							
<i>Atlapetes albinucha</i>	Atlapetes gorgiamarillo			800-2600*	X	X	X	X	X	X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Atlapetes pallid-nucha</i>	Atlapetes cabeciblanco			2400-3600	X					X		
<i>Atlapetes schistaceus</i>	Atlapetes pizarra			1900-3700	X	X		X	X	X		
<i>Atlapetes latinuchus</i>	Atlapetes ventriamarillo			1600-2700*	X		X	X	X			
<i>Coryphospingus pileatus</i>	Cardonero pileado			0-450								X
Familia Cardinalidae												
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Picogordo degollado			0-3800	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Saltator grossus</i>	Saltátor pizarra			0-1200							X	X
<i>Saltator maximus</i>	Saltátor oliva			0-1700		X	X	X	X	X	X	X
<i>Saltator atripennis</i>	Saltátor alinegro			400-2200*	X	X		X	X	X	X	
<i>Saltator coerulescens</i>	Saltátor grisáceo			0-1300	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Saltator striatipectus</i>	Saltátor tío judío			0-2700*	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Saltator cinctus</i>	Saltátor collarajo	VU		2000-3000	X					X		
<i>Cyanocopsa cyanoides</i>	Azulón silvícola			0-1400							X	X
<i>Spiza americana</i>	Arrocero migratorio			0-1600								X
Familia Parulidae												
<i>Vermivora chrysoptera</i>	Reinita alidorada			0-2700	X	X	X	X	X	X		X
<i>Vermivora peregrina</i>	Reinita verderona			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Parula pitiayumi</i>	Reinita tropical			0-2600		X	X	X	X	X	X	X
<i>Dendroica pensylvanica</i>	Reinita de Pensilvania			Migratoria				X				
<i>Dendroica petechia</i>	Reinita amarilla			0-2000		X	X	X	X	X	X	X
<i>Dendroica striata</i>	Reinita rayada			0-2600					X			
<i>Dendroica castanea</i>	Reinita castaña			0-1200		X	X	X	X	X	X	X
<i>Dendroica fusca</i>	Reinita naranja			0-3600	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Dendroica cerulea</i>	Reinita azul y negra			500-2000		X		X	X			
<i>Setophaga ruticilla</i>	Reinita nortea			0-2800		X	X	X	X	X	X	X
<i>Mniotilta varia</i>	Zebrit			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Protonotaria citrea</i>	Reinita cabe-cidorada			0-1000			X	X	X		X	X
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Reinita acuática			0-2000	X	X		X	X	X	X	X
<i>Seiurus motacilla</i>	Reinita de Luisiana			0-1700		X			X			
<i>Oporornis agilis</i>	Reinita pechigrís			0-4200		X	X	X	X	X		
<i>Oporornis philadelphia</i>	Reinita enlutada			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Reinita enmascarada			0-500					X	X		X
<i>Wilsonia canadensis</i>	Reinita del Canadá			0-2600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Myioborus miniatus</i>	Abanico pechinegro			500-2700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Myioborus ornatus</i>	Abanico cariblanco		REST	1800-3400	X		X	X	X	X		
<i>Basileuterus luteoviridis</i>	Arañero cetrino			1700-3400		X		X	X	X		
<i>Basileuterus nigrocristatus</i>	Arañero cabe-cinegro			1300-3400	X			X	X	X		
<i>Basileuterus coronatus</i>	Arañero coronado			1400-3100	X	X	X	X	X	X		
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Arañero cejiblanco			300-2000	X	X	X	X	X	X		
<i>Basileuterus rufifrons</i>	Arañero cabecirrufo			0-1900		X	X	X	X	X	X	X
<i>Basileuterus tristriatus</i>	Arañero cabe-cilistado			300-2500	X	X	X	X	X	X		X
<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>	Arañero ribereño			0-1000		X		X		X	X	X
Familia Icteridae												
<i>Psarocolius angustifrons</i>	Oropéndola común			400-2400	X		X	X	X	X	X	
<i>Psarocolius wagleri</i>	Oropéndola de Wagler			0-1000	X		X	X		X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Psarocolius decumanus</i>	Oropéndola crestada			0-2600	X		X	X	X	X	X	X
<i>Psarocolius guatimozinus</i>	Oropéndola negra		REST	0-800							X	
<i>Cacicus chrysotus</i>	Arrendajo de montaña			1700-3200*	X			X	X	X		
<i>Cacicus cela</i>	Arrendajo común			0-600	X	X					X	X
<i>Cacicus uropygialis</i>	Arrendajo escarlata	NT		0-2300						X	X	
<i>Amblycercus holosericeus</i>	Arrendajo negro			0-3300	X			X	X	X		
<i>Icterus mesomelas</i>	Turpial coliamarillo			0-1600					X	X	X	X
<i>Icterus spurius</i>	Turpial hortelano			0-500		X			X	X		
<i>Icterus auricapillus</i>	Turpial cabe-cirrojo			0-800							X	X
<i>Icterus chrysater</i>	Turpial montañero			50-2700	X	X	X		X	X	X	X
<i>Icterus galbula</i>	Turpial de Baltimore			0-1600		X		X	X	X		X
<i>Icterus nigrogularis</i>	Turpial amarillo			0-300	X	X			X	X	X	X
<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>	Cacique candela	EN	NAL	1200-2700	X	X		X	X	X	X	
<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Monjita cabe-ciamarilla			0-2600*					X		X	X
<i>Molothrus oryzivorus</i>	Chamón gigante			0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molothrus bonariensis</i>	Chamón parásito			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sturnella militaris</i>	Soldadito			0-1600	X	X		X	X	X	X	X
<i>Sturnella magna</i>	Chirlobirlo			0-3500					X	X		
Familia Fringillidae												
<i>Carduelis spinescens</i>	Jilguero andino			1800-3700	X				X			
<i>Carduelis magellanica</i>	Jilguero encauchado			2300-3300*	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Carduelis xanthogastra</i>	Jilguero pechinegro			1000-3000	X	X	X	X	X	X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Carduelis psaltria</i>	Jilguero aliblanco			200-3100	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Euphonia trinitatis</i>	Eufonia de trinidad			0-1100							X	X
<i>Euphonia lanirostris</i>	Eufonia caliandra			0-1800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Euphonia cyanocephala</i>	Eufonia cabeciazul			1400-2100*	X	X	X	X	X	X		X
<i>Euphonia fulvicrissa</i>	Eufonia fulva			0-1000						X	X	X
<i>Euphonia minuta</i>	Eufonia rabiblanca			0-1000							X	
<i>Euphonia xanthogaster</i>	Eufonia común			0-2600	X	X		X		X	X	X
<i>Chlorophonia cyanea</i>	Clorofonia verdeazul			600-2100	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>	Clorofonia ferrugínea			1400-2700	X		X		X			

ANEXO 3

Listado Oficial de Mamíferos no Voladores Presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA

A continuación se presenta el listado oficial de los Mamíferos no Voladores silvestres presentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Con el fin de universalizar la información presentada se definieron los siguientes campos:

° **Taxón:**

Se refiere al Orden, familia , genero y especie.

° **Nombre vernáculo:**

Nombre común dado a la especie.

° **Categoría de Amenaza Nacional:**

Se tomó como referencia la Lista de estatus de Conservación de los Mamíferos Neotropicales, según la Lista Roja de especies de fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) a nivel nacional validadas por el MAVDT.

° **Endemismo:**

Se refiere al nivel de restricción en su distribución Nal: De orden nacional , REST: Restringida y LOC: local.

° **Distribución Altitudinal:**

Rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar) en que normalmente y de manera natural se encuentra la especie.

° **Territoriales:**

Se refiere a las jurisdicciones de las Direcciones Territoriales en que esta administrativamente dividida CORANTIOQUIA y en cuyo territorio se verifico la presencia de la especie: CI: Citara; CA: Cartama; HE: Hevéxicos; AS: Aburrá Sur; AN: Aburrá Norte; TA: Tahamíes; ZE: Zenufaná; PA: Panzenú.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN DIDELPHIMORPHIA												
Familia Caluromyidae												
Subfamilia Caluromyinae												
<i>Caluromys derbianus</i>	Chucha lanuda		REST	0-2500	X						X	X
<i>Caluromys lanatus</i>	Chucha real roja			0-1500						X	X	X
Familia Didelphidae												
<i>Chironectes minimus</i>	Chucha de agua			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Didelphis pernigra</i>	Chucha de oreja blanca			1800-4000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Didelphis marsupialis</i>	Chucha común			1800-4000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Philander opossum</i>	Chucha cuatro ojos			0-2500	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Marmosidae												
Subfamilia Marmosinae												
<i>Marmosa murina</i>	Marmosa común			0-1500	X	X	X		X	X	X	X
<i>Marmosa robinsoni</i>	Marmosa roja			0-1400	X	X	X	X		X	X	X
<i>Marmosops handleyi</i>	Marmosa de Handley	CR	NAL	0-2000							X	X
<i>Marmosops imavidus</i>	Marmosa esbelta	LR		1400		X		X				
<i>Marmosops parvidens</i>	Marmosa esbelta			0-1000		X				X	X	X
<i>Micoureus phaeus</i>	Marmosa lanuda		REST	90-2000	X							
<i>Micoureus cf. demerarae</i>				1000-2500						X		
<i>Micoureus regina</i>	Marmosa lanuda		REST	0-1800						X	X	X
Subfamilia Metachirinae												
<i>Metachirus nudicaudatus</i>	Chucha mantequera			0-1700	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Subfamilia Monodelphinae												
<i>Monodelphis adusta</i>	Chuchita colicorta			200-2200	X	X	X			X	X	X
ORDEN PAUCITUBERCULATA												
Familia Caenolestidae												
<i>Caenolestes convelatus</i>	Ratón ciego		REST	1800-3800		X	X					
<i>Caenolestes fuliginosus</i>	Ratón ciego		REST	2000-3800				X				
ORDEN FOLIVORA												
Familia Bradypodidae												
<i>Bradypus variegatus</i>	Perezoso de tres dedos		CA-RISM	0-2500	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Megalonychidae												
Subfamilia Choloepinae												
<i>Choloepus hoffmanni</i>	Perezoso de dos dedos		CA-RISM	0-2500	X	X				X	X	X
ORDEN CINGULATA												
Familia Dasypodidae												
Subfamilia Dasypodinae												
<i>Cabassous centralis</i>	Armadillo coiletrapo		CA-RISM	0-2000	X	X		X		X	X	X
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Armadillo común			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
ORDEN VERMILINGUA												
Familia Myrmecophagidae												
<i>Cyclopes didactylus</i>	Osito trueno, angelito		CA-RISM	0-1500						X	X	X
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Oso caballuno, palmero	VU	REST	0-1900						X	X	X
<i>Tamandua mexicana</i>	Tamandua, oso hormiguero			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN INSECTIVORA												
Familia Soricidae												
Subfamilia Soricinae												
<i>Cryptotis colombiana</i>	Musaraña		NAL	1750-3600				X	X			X
<i>Cryptotis medellinia</i>	Musaraña		NAL	1800-2700			X	X	X			X
ORDEN PRIMATES												
Familia Callitrichidae												
<i>Saguinus geoffroyi</i>	Tití del Chocó		REST	0-1200	X							
<i>Saguinus leucopus</i>	Tití gris	EN	NAL	0-1800				X	X	X	X	X
<i>Saguinus oedipus</i>	Tití cabeciblanco	VU	NAL	0-1000								X
Familia Cebidae												
Subfamilia Alouattinae												
<i>Alouatta seniculus</i>	Mono aullador		CA-RISM-REST	0-1600		X				X	X	X
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Churucú, barrigudo		REST	0-3000						X	X	
Subfamilia Aotinae												
<i>Aotus lemurinus</i>	Mico de noche	VU		0-3500	X	X	X	X	X	X	X	X
Subfamilia Atelinae												
<i>Ateles geoffroyi</i>	Mono araña	EN	REST	0-2400							X	X
<i>Ateles hybridus</i>	Mono araña	CR	NAL	0-1000		X				X	X	X
Familia Cebidae												
<i>Cebus albifrons</i>	Mico maicero		REST	0-2000						X	X	X
<i>Cebus capucinus</i>	Mico capuchino		REST	0-2000	X	X				X	X	
ORDEN CARNIVORA												
Familia Canidae												
<i>Cerdocyon thous</i>	Zorro perro, perruno			0-3200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Speothos venaticus</i>	Perrito venadero		REST	0-1600							X	X
<i>Urocyon cinereoargenteus</i>	Zorro gatuno o plateado			0-3300		X				X	X	X
Familia Ursidae												
<i>Tremarctos ornatus</i>	Oso de anteojos	VU	REST	500-4000						X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Familia Procyonidae												
<i>Bassaricyon gabbii</i>	Olingo, maco-perro		REST	0-2500	X	X				X	X	
<i>Potos flavus</i>	Perro de monte			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Nasua narica</i>	Cusumbo de nariz blanca		REST	0-3200	X							
<i>Nasua nasua</i>	Cusumbo			0-3600	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Nasuella olivacea</i>	Cusumbo de páramo		REST	1700-4040			X	X				X
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mapache			0-1600	X	X	X			X	X	X
Familia Mustelidae												
Subfamilia Lutrinae												
<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria	VU	REST	0-2800	X	X				X	X	X
Subfamilia Mephitinae												
<i>Conepatus semistriatus</i>	Zorrillo, mapurito			0-3100						X	X	X
Subfamilia Mustelinae												
<i>Eira barbara</i>	Ulamá, tayra			0-3200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Galictis vittata</i>	Hurón, grisón, mapuro		REST	0-1200						X	X	X
<i>Mustela felipei</i>	Comadreja	VU	NAL	0-2500					X			
<i>Mustela frenata</i>	Comadreja común			0-3600	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Felidae												
Subfamilia Felinae												
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Gatuno, yaguarondi			0-3200	X	X	X	X		X	X	X
<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote, tigrillo		REST	0-2200	X	X		X		X	X	X
<i>Leopardus tigrinus</i>	Tigrillo, oncilla	VU		1600-3400	X		X			X	X	X
<i>Leopardus wiedii</i>	Tigrillo, margay			1600-1800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Puma concolor</i>	Puma, león colorado		REST	0-4100	X	X	X	X	X	X	X	X
Subfamilia Pantherinae												
<i>Panthera onca</i>	Jaguar, tigre mariposo	VU	REST	0-3400						X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN PERISSODACTYLA												
Familia Tapiridae												
<i>Tapirus bairdii</i>	Tapir, danta	CR	REST	0-1000	X							
<i>Tapirus pinchaque</i>	Tapir de páramo	EN	REST	1400-4000							X	X
<i>Tapirus terrestris</i>	Tapir, danta	CR	REST	0-2400						X	X	X
ORDEN ARTIODACTYLA												
Familia Tayassuidae												
<i>Pecari tajacu</i>	Pecari de collar, saíno			0-2000	X	X	X			X	X	X
<i>Tayassu pecari</i>	Pecari de labio blanco			0-1800						X	X	X
Familia Cervidae												
Subfamilia Odocoileinae												
<i>Mazama americana</i>	Venado colorado			0-4000	X	X		X		X	X	X
<i>Mazama rufina</i>	Venado colorado		REST	2000-4000			X					X
<i>Odocoileus virginianus</i>	Venado de cola blanca	CR	REST	0-4000						X	X	X
ORDEN RODENTIA												
Familia Sciuridae												
Subfamilia Sciurinae												
<i>Microsciurus mimulus</i>	Ardilla cusca			0-2000	X	X		X				
<i>Microsciurus pucheranii</i>	Ardilla de los robledales		NAL	2000-3500	X		X					X
<i>Microsciurus santanderensis</i>	Ardilla pioja, rabricana		NAL	1700-2800						X	X	X
<i>Sciurus granatensis</i>	Ardilla alazana			0-3800	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Heteromyidae												
Subfamilia Heteromyinae												
<i>Heteromys anomalus</i>	Ratón chacaro			0-1500	X					X	X	X
<i>Heteromys australis</i>	Ratón chacaro			0-2500	X						X	X
Familia Muridae												
Subfamilia Murinae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Mus musculus</i>	Ratón casero			0-3500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Rattus norvegicus</i>	Rata de Noruega			0-3500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Rattus rattus</i>	Rata común			0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
Subfamilia Sigmodontinae												
<i>Aepeomys fuscatus</i>	Ratón de selva nublada		NAL	1500-2800	X	X						
<i>Akodon affinis</i>	Ratón de campo		NAL	1300-3000	X	X	X	X				X
<i>Handleyomys intectus</i>				1500-2500						X		
<i>Melanomys caliginosus</i>	Ratón prieto			0-2000	X		X		X			X
<i>Microzomys minutus</i>	Ratoncito diminuto			1900-3600			X		X		X	
<i>Neacomys tenuipes</i>	Ratoncito espinoso			0-1200					X	X		X
<i>Nectomys magdalenae</i>	Rata acuática mayor		NAL	0-500						X		
<i>Nectomys squamipes</i>	Rata acuática menor			0-1000		X	X			X	X	X
<i>Oligoryzomys fulvescens</i>	Ratón pigmeo			0-3300	X					X	X	X
<i>Oryzomys albigularis</i>	Ratón gargantiblanco			1500-3400	X	X	X	X	X			X
<i>Oryzomys alfaroi</i>	Ratón de Alfaro			0-2000					X	X	X	X
<i>Oryzomys gorgasi</i>	Ratón del Atrato		NAL	0-200						X		
<i>Oryzomys intectus</i>	Ratón antioqueño		NAL	1500-2800					X		X	X
<i>Oryzomys perenensis</i>	Ratón oriental			0-500	X			X	X			X
<i>Oryzomys talamancae</i>	Ratón costarricense		REST	0-1700				X	X		X	X
<i>Reithrodontomys mexicanus</i>	Ratón centroamericano			500-3000	X	X	X	X		X	X	X
<i>Rhipidomys latimanus</i>	Ratón trepador		REST	1000-3300			X					X
<i>Sigmodon hispidus</i>	Ratón saba-nero			0-2600	X	X	X			X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Sigmodontomys alfari</i>	Ratón selvático		REST	0-2000	X							X
<i>Thomasomys aureus</i>	Ratón montañero canela		REST	2000-3400								X
<i>Thomasomys bombycinus</i>	Ratón de Paramillo		NAL	3800								X
<i>Thomasomys cinereiventris</i>	Ratón montañero cenizo			2000-3500						X		X
<i>Thomasomys laniger</i>	Ratón patinegro		REST	2600-3600		X						
<i>Tylomys mirae</i>	Ratón del río Mira		REST	0-1300						X		X
<i>Zygodontomys brevicauda</i>	Ratón colicorto			0-1600	X	X		X	X	X	X	X
Familia Erethizontidae												
<i>Coendou prehensilis</i>	Erizo común			0-4000	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Dinomyidae												
<i>Dinomys branickii</i>	Guagua loba, pacarana	VU		300-3500	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Dasyproctidae												
<i>Dasyprocta punctata</i>	Ñeque, guatín			0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Hydrochaeridae												
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Chigüiro, lancho		REST	0-900						X	X	
Familia Cuniculidae												
<i>Agouti paca</i>	Guagua, boruga		CARISM	0-2000/3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Agouti taczanowskii</i>	Guagua de páramo			1700-3700	X	X	X	X	X	X	X	X
Familia Echimyidae												
Subfamilia Dactylomyinae												
<i>Olallamys albicauda</i>	Conocono de chuscal		NAL	2000-3300			X		X	X	X	X
Subfamilia Echiomyinae												
<i>Diplomys caniceps</i>	Conocono crestirojo		NAL	0-500	X	X	X	X	X		X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Echimys semivillosus</i>	Rata espinosa arbórea		REST	0-500						X	X	X
Subfamilia Eumysopinae												
<i>Hoplomys gymnurus</i>	Ratón de espina		REST	0-900	X							X
<i>Proechimys chrysaeolus</i>	Casiragua boyacense		NAL	100-500					X		X	
<i>Proechimys magdalenae</i>	Casiragua del Magdalena		NAL	0-500						X	X	X
<i>Proechimys semispinosus</i>	Casiragua chocoana			0-500	X							
ORDEN LAGOMORPHA												
Familia Leporidae												
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Conejo de monte			0-3800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sylvilagus floridanus</i>	Conejo sabanero		REST	0-2100						X	X	X
ORDEN SIRENIA												
Familia Trichechidae												
<i>Trichechus manatus</i>	Manatí	EN									X	X

ANEXO 4

Listado Oficial de Mamíferos Voladores Presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA

A continuación se presenta el listado oficial de los Mamíferos no Voladores presentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Con el fin de universalizar la información presentada se definieron los siguientes campos:

° **Taxón:**

Se refiere al Orden, familia , genero y especie.

° **Distribución Altitudinal:**

Rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar) en que normalmente y de manera natural se encuentra la especie.

° **Territoriales:**

Se refiere a las jurisdicciones de las Direcciones Territoriales en que esta administrativamente dividida CORANTIOQUIA y en cuyo territorio se verificó la presencia de la especie: CI: Citará; CA: Cartama; HE :Hevéxicos; AS: Aburrá Sur; AN: Aburrá Norte; TA: Tahamíes; ZE: Zenufaná; PA:Panzenú.

En este grupo no se contemplaron las siguientes categorías Nombre vernáculo o nombre común dado a la especie, pues en la mayoría de los casos el nombre de murciélago es el dado a la especie.

Categoría de Amenaza Nacional, no existe categorización para las especies reportadas y con la categoría de Endemismo solo se ha de considerar las especies raras o de distribución restringida como Mormoops megalophylla, Rhynchonycteris naso, Saccoteryx antioquensis presentes en la jurisdicción.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN CHIROPTERA									
Familia Emballonuridae									
<i>Centronycteris centralis</i>	0-1450		X	X				X	X
<i>Centronycteris maximiliani</i>	0-1000		X	X				X	X
<i>Cormura brevirostris</i>	0-1000		X				X		
<i>Peropteryx kappleri</i>	0-1000	X		X			X		
<i>Peropteryx macrotis</i>	0-700						X		
<i>Rhynchonycteris naso</i>	0-1000						X		
<i>Saccopteryx antioquiensis</i>	0-1100						X		
<i>Saccopteryx bilineata</i>	0-1000						X	X	X
<i>Saccopteryx canescens</i>	0-1000	X		X		X	X	X	X
<i>Saccopteryx leptura</i>	0-1000		X	X			X	X	X
Familia Noctilionidae									
<i>Noctilio albiventris</i>	0-2000						X	X	X
<i>Noctilio leporinus</i>	0-1500						X	X	X
Familia Mormoopidae									
<i>Mormoops megalophylla</i>	0-2000	X		X			X	X	X
<i>Pteronotus davyi</i>	0-1800	X		X				X	X
<i>Pteronotus gymnonotus</i>	0-1500			X				X	X
<i>Pteronotus parnellii</i>	0-1800			X				X	X
<i>Pteronotus personatus</i>	0-1800	X		X			X	X	X
Familia Phyllostomidae									
Subfamilia Phyllostominae									
<i>Chrotopterus auritus</i>	0-500	X	X	X			X	X	X
<i>Lonchorhina aurita</i>	0-1500						X		
<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	0-1600	X	X	X			X	X	X
<i>Micronycteris brachyotis</i>	0-1000	X	X	X			X	X	X
<i>Micronycteris hirsuta</i>	0-1000	X	X	X			X	X	X
<i>Micronycteris megalotis</i>	0-2000	X	X	X		X	X	X	X
<i>Micronycteris minuta</i>	0-1800								X
<i>Micronycteris pusilla</i>	0-1600						X		
<i>Micronycteris schmidtorum</i>	0-2600	X	X				X		X
<i>Micronycteris sylvestris</i>	0-1600						X	X	X
<i>Mimon bennettii</i>	0-1000	X		X			X	X	X
<i>Mimon crenulatum</i>	0-1100						X		
<i>Phyloderma stenops</i>	0-1500	X		X			X	X	X
<i>Phyllostomus discolor</i>	0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Phyllostomus elongatus</i>	0-1500				X			X	
<i>Phyllostomus hastatus</i>	0-1800			X	X		X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Phyllostomus latifolius</i>	0-1400	X	X	X	X				
<i>Tonatia bidens</i>	0-1000	X	X	X	X		X		
<i>Tonatia brasiliense</i>	0-1200								X
<i>Tonatia silvicola</i>	0-1200						X		X
<i>Trachops cirrhosus</i>	0-1120	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Vampyrus spectrum</i>	0-1070								X
Subfamilia Lonchophyllinae									
<i>Lionycteris spurrelli</i>	0-2100						X		X
<i>Lonchophylla handleyi</i>	250-2100								X
<i>Lonchophylla mordax</i>	0-1100	X	X	X					
<i>Lonchophylla robusta</i>	30-2000	X	X				X	X	X
<i>Lonchophylla thomasi</i>	0-1800	X	X	X			X	X	X
Subfamilia Glossophaginae									
<i>Anoura caudifera</i>	500-3200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Anoura cultrata</i>	800-4800	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Anoura geoffroyi</i>	1200-4080			X	X	X			X
<i>Anoura latidens</i>	500-3000	X	X				X		X
<i>Choeroniscus godmani</i>	0-1250				X				X
<i>Choeroniscus minor</i>	1000-3000						X		
<i>Glossophaga commissarisi</i>	0-2000		X		X	X	X	X	
<i>Glossophaga longirostris</i>	0-1800		X	X	X	X	X		
<i>Glossophaga soricina</i>	0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Leptonycteris curasoae</i>	0-500			X			X	X	X
<i>Lichonycteris obscura</i>	0-1000	X	X	X	X		X		
Subfamilia Carolliinae									
<i>Carollia brevicauda</i>	1250-4080	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Carollia castanea</i>	0-1500				X	X	X	X	X
<i>Carollia colombiana</i>	0-2000		X			X	X	X	
<i>Carollia perspicillata</i>	0-1880	X	X	X	X	X	X	X	X
Subfamilia Stenodermatinae									
<i>Artibeus amplus</i>	0-1500		X				X	X	
<i>Artibeus anderseni</i>	0-1200	X					X	X	
<i>Artibeus cinereus</i>	0-2000				X		X	X	X
<i>Artibeus glaucus</i>	0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Artibeus gnomus</i>	0-600	X	X						
<i>Artibeus hartii</i>	0-3000					X			X
<i>Artibeus intermedius</i>	0-1500	X	X					X	
<i>Artibeus jamaicensis</i>	0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Artibeus lituratus</i>	0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Artibeus obscurus</i>	0-1400	X	X				X	X	
<i>Artibeus phaeotis</i>	0-1500						X		X
<i>Artibeus planirostris</i>	0-1750		X		X				X
<i>Artibeus toltecus</i>	0-3000		X	X	X				X
<i>Centurio senex</i>	0-1500			X				X	X
<i>Chiroderma salvini</i>	500-2500						X		X
<i>Chiroderma trinitatum</i>	0-1000						X		X
<i>Chiroderma villosum</i>	0-1000						X	X	X
<i>Mesophylla macconnelli</i>	0-1200								X
<i>Platyrrhinus aurarius</i>	500-2400				X	X		X	X
<i>Platyrrhinus brachycephalus</i>	0-1500		X		X		X	X	X
<i>Platyrrhinus chocoensis</i>	0-1500	X	X						
<i>Platyrrhinus dorsalis</i>	0-2300	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Platyrrhinus helleri</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Platyrrhinus infuscus</i>	0-2600								X
<i>Platyrrhinus umbratus</i>	300-2600			X					
<i>Platyrrhinus vittatus</i>	0-2600		X			X		X	X
<i>Sturnira aratathomasi</i>	1000-2500				X				X
<i>Sturnira bidens</i>	1700-3000				X		X		X
<i>Sturnira bogotensis</i>	0-2600				X	X	X		X
<i>Sturnira erythromos</i>	1100-4080	X		X	X	X	X	X	X
<i>Sturnira lilium</i>	0-2200	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sturnira ludovici</i>	1200-4080			X	X	X	X		X
<i>Sturnira luisi</i>	0-1700	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Sturnira mistratensis</i>	0-1500	X	X				X		
<i>Sturnira mordax</i>	470-2200				X		X	X	
<i>Sturnira oporaphillum</i>	2000-3600	X	X	X	X				X
<i>Sturnira thomasi</i>	50-2000				X				
<i>Sturnira tildae</i>	0-1700	X	X	X		X	X		X
<i>Uroderma bilobatum</i>	0-1900	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Uroderma magirostrum</i>	0-1000			X			X	X	
<i>Vampyressa bidens</i>	0-1000		X				X		
<i>Vampyressa brocki</i>	0-500							X	
<i>Vampyressa nymphaea</i>	0-500							X	
<i>Vampyressa pusilla</i>	200-2150	X	X		X	X		X	X
<i>Vampyrodes caraccioli</i>	0-800								X
Subfamilia Desmodontinae									
<i>Desmodus rotundus</i>	0-3000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Diaemus youngi</i>	0-1400	X	X				X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Diphylla ecaudata</i>	0-2000	X	X	X			X	X	X
Familia Natalidae									
<i>Natalus stramineus</i>	0-1000			X				X	X
Familia Furipteridae									
<i>Furipterus horrens</i>	0-1500			X				X	X
Familia Thyropteridae									
<i>Thyroptera discifera</i>	0-1200	X	X	X			X	X	X
<i>Thyroptera tricolor</i>	0-2000						X		
Familia Vespertilionidae									
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	0-3000	X	X					X	
<i>Eptesicus diminutus</i>	0-1500	X		X			X		
<i>Eptesicus furinalis</i>	0-1250		X		X				
<i>Eptesicus fuscus</i>	800-4000		X		X	X			X
<i>Histiotus montanus</i>	1500-4000				X	X			X
<i>Lasiurus borealis</i>	0-2000					X			X
<i>Lasiurus castaneus</i>	0-1500	X	X						X
<i>Lasiurus cinereus</i>	0-1500	X	X	X			X	X	X
<i>Lasiurus ega</i>	0-1000							X	
<i>Myotis albescens</i>	0-1500				X	X			X
<i>Myotis keaysi</i>	0-3000					X	X		X
<i>Myotis nesopolus</i>	0-100						X	X	
<i>Myotis nigricans</i>	0-3150	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Myotis oxyotus</i>	0-3200	X					X		X
<i>Myotis ripaius</i>	0-1500						X	X	X
<i>Rhogeessa minutilla</i>	0-1500		X		X		X	X	X
<i>Rhogeessa tumida</i>	0-1500	X	X	X			X	X	X
Familia Molossidae									
<i>Eumops auripendulus</i>	0-1000					X			
<i>Eumops bonariensis</i>	0-1000	X	X				X	X	
<i>Eumops glaucinus</i>	0-1500				X	X		X	X
<i>Eumops hansae</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molossops abrasus</i>	0-1000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molossops greenhalli</i>	0-1000					X			
<i>Molossops temminckii</i>	0-1000					X	X		
<i>Molossus bondae</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molossus molossus</i>	0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molossus pretiosus</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Molossus rufus</i>	0-1500								
<i>Molossus sinaloe</i>	0-2000	X	X	X	X	X	X	X	X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Nyctinomops aurispinosus</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Nyctinomops macrotis</i>	0-2400	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Promops centralis</i>	0-1500	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Tadarida brasiliensis</i>	0-3000			X		X			

ANEXO 5

Listado Oficial de Anfibios Presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA

A continuación se presenta el listado oficial de los Anfibios presentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Con el fin de universalizar la información presentada se definieron los siguientes campos:

° **Taxón:**

Se refiere al Orden, familia , genero y especie.

° **Nombre vernáculo:**

Nombre común dado a la especie, para muchos de ellos no se encontró información.

° **Categoría de Amenaza Nacional:**

Parámetro tomado de los libros rojos publicados por el Instituto Alexander von Humboldt.

° **Endemismo:**

Se refiere al nivel de restricción en su distribución Nal: De orden nacional, REST: Restringida y LOC: local.

° **Distribución Altitudinal:**

Rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar) en que normalmente y de manera natural se encuentra la especie.

° **Territoriales:**

Se refiere a las jurisdicciones de las Direcciones Territoriales en que esta administrativamente dividida CORANTIOQUIA y en cuyo territorio se verificó la presencia de la especie: CI: Citará; CA: Cartama; HE: Hevéxicos; AS: Aburrá Sur; AN: Aburrá Norte; TA: Tahamíes; ZE: Zenufaná; PA: Panzenú.

El listado esta dividido en los tres Ordenes presentes en la jurisdicción: ANURA, CAUDATA y GYMNOPTERA.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN ANURA												
Familia Bufonidae												
<i>Atelopus sanjosei</i>	arlequin de anorí		REST	450						X		
<i>Atelopus sernai</i>	sapito arlequín de serna	EN	REST	2800-3100					X	X		
<i>Bufo granulosus</i>				0-1500								X
<i>Bufo haematiticus</i>				75-1000			X			X	X	X
<i>Bufo marinus</i>	Sapo comun			0-1700	X		X	X		X	X	X
<i>Bufo gr. margaritifera</i>				100-1150			X				X	X
<i>Rhombophryne macrorrhina</i>	Sapo trompudo de antioquia	VU	NAL	1450-3100							X	X
<i>Rhombophryne nicefori</i>			REST	1800-2800			X	X		X		
<i>Rhombophryne ruizi</i>			REST	2330-3100					X	X		
Familia Centrolenidae												
<i>Centrolene antioquiensis</i>			NAL	2040-2080					X	X		
<i>Centrolene buckleyi</i>				2100-3500					X	X		
<i>Centrolene quindianum</i>			NAL	1900-2050					X			
<i>Centrolene robledoii</i>			NAL	1850-2940					X	X		X
<i>Cochranella garciae</i>			NAL	1900-3030					X			
<i>Cochranella posadae</i>			NAL	1900-2800					X			
<i>Cochranella rosada</i>			NAL	1100-2000								X
<i>Cochranella savagei</i>			NAL	1800-2410					X			
<i>Cochranella susatamai</i>			NAL	500-1650								X
<i>Hyalinobatrachium fleischmanni</i>				60-1000						X	X	
<i>Hyalinobatrachium valerioi</i>				0-500								X
Familia Dendrobatidae												
<i>Colostethus abditus</i>			NAL	1450-2000					X			

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Colostethus betancuri</i>			LOC	1450						X		
<i>Colostethus bocagei</i>				1170-2000					X			
<i>Colostethus borjai</i>			LOC	1000-1500							X	
<i>Colostethus cacerensis</i>			REST	50-85								X
<i>Colostethus erasmios</i>			REST	1500-2000							X	
<i>Colostethus excisus</i>			REST	2200				X				
<i>Colostethus fraterdanieli</i>			NAL	800-2900	X		X	X	X	X		
<i>Colostethus furvi-ventris</i>			REST	1500						X		
<i>Colostethus inguinalis</i>				300-800							X	
<i>Colostethus palmatus</i>			NAL	350-2500							X	X
<i>Colostethus pratti</i>				110-1600							X	X
<i>Colostethus pseudopalmatus</i>			REST	800-1500							X	X
<i>Colostethus subpunctatus</i>			NAL	2100-4200						X		
<i>Colostethus thorntoni</i>			LOC	1480-2270					X			
<i>Colostethus yaguara</i>			LOC	1575						X		
<i>Dendrobates opisthomelas</i>			NAL	1800-2060	X					X	X	
<i>Dendrobates truncatus</i>			NAL	50-1000				X			X	X
Familia Hylidae												
<i>Cryptobatrachus fuhrmanni</i>			NAL	900-2000					X			
<i>Gastrotheca bufona</i>			NAL	1990-2200					X			
<i>Gastrotheca dunni</i>			REST	2200-2700					X			
<i>Gastrotheca nicefori</i>				400-2265					X			
<i>Hyla boans</i>				0-500				X			X	X
<i>Hyla boguerti</i>			REST	1000-2580				X	X	X		X
<i>Hyla columbiana</i>			NAL	950-2600			X	X		X		
<i>Hyla crepitans</i>				0-1700							X	X
<i>Hyla ebraccata</i>				50-1600						X		X

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Hyla larinopygion</i>				1950-3100			X		X	X		
<i>Hyla microcephala</i>				0-950						X	X	X
<i>Hyla palmeri</i>				100-1600						X		
<i>Hyla phantasmagoria</i>	Rana planeadora gigante	CR	LOC	20								X
<i>Hyla pugnax</i>				0-1100						X	X	X
<i>Hyla vigilans</i>				0-200							X	X
<i>Phrynohyas venulosa</i>				0-800						X	X	
<i>Phyllomedusa venusta</i>				130-1000						X	X	
<i>Scinax rostrata</i>				300-1100						X	X	X
<i>Scinax ruber</i>				0-1100							X	X
<i>Smilisca phaeota</i>				0-1560						X		X
<i>Smilisca sila</i>				0-1100							X	
Familia Leptodactylidae												
<i>Eleutherodactylus achatinus</i>				10-1900	X	X		X	X			
<i>Eleutherodactylus boulengeri</i>			NAL	2430-3300				X				
<i>Eleutherodactylus brevifrons</i>				1140-3200	X	X		X	X			
<i>Eleutherodactylus bufoniformis</i>				75-1780						X		
<i>Eleutherodactylus erythroleura</i>			NAL	980-1470						X		
<i>Eleutherodactylus factiosus</i>			NAL	1940-2150							X	
<i>Eleutherodactylus fallax</i>		VU	NAL	1100-1850							X	
<i>Eleutherodactylus gaigeae</i>				10-1200						X	X	
<i>Eleutherodactylus gracilis</i>			NAL	1900-2320					X			
<i>Eleutherodactylus gularis</i>				0-1060								X
<i>Eleutherodactylus helvolus</i>			NAL	1800-1890						X		
<i>Eleutherodactylus latens</i>			NAL	2720-3200					X	X		

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Eleutherodactylus lemur</i>			NAL	1800-1950						X	X	
<i>Eleutherodactylus longirostris</i>				0-1360			X	X			X	X
<i>Eleutherodactylus maculosus</i>	Rana de lluvia manchada	EN	NAL	2560-2900						X		
<i>Eleutherodactylus mantipus</i>			NAL	800-1400						X	X	
<i>Eleutherodactylus paisa</i>			REST	1800-3100		X		X	X	X		
<i>Eleutherodactylus palmeri</i>			NAL	1050-2200					X			
<i>Eleutherodactylus parectatus</i>			NAL	1800-2850					X			
<i>Eleutherodactylus penelopus</i>			NAL	1180-1750						X		
<i>Eleutherodactylus permixtus</i>			NAL	2150-3700		X	X		X	X		
<i>Eleutherodactylus phragmipleuron</i>	Rana ladrona de azúcar	CR	LOC	1800					X			
<i>Eleutherodactylus piceus</i>			NAL	2540-3400					X	X		
<i>Eleutherodactylus raniformis</i>				0-1440			X	X		X	X	X
<i>Eleutherodactylus ruizi</i>	Rana de lluvia de ruiz	EN	NAL	1500-2000					X			
<i>Eleutherodactylus scoloblepharus</i>	Rana de lluvia cejuda	EN	REST	2620						X		
<i>Eleutherodactylus suetus</i>	Rana de lluvia minúscula	VU	NAL	1750-2780						X	X	
<i>Eleutherodactylus supernatis</i>				2500-3200		X						
<i>Eleutherodactylus taeniatus</i>				0-1150						X	X	X
<i>Eleutherodactylus thecopternus</i>			NAL	1580-2540	X				X			
<i>Eleutherodactylus tinkler</i>			NAL	1400								X
<i>Eleutherodactylus uranobates</i>			NAL	3350-3480						X		
<i>Eleutherodactylus viejas</i>			NAL	565-1950						X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Eleutherodactylus w-nigrum</i>				800-3200				X		X		
<i>Eleutherodactylus zophus</i>			REST	2030-2800	X							
<i>Leptodactylus bolivianus</i>				0-810						X		
<i>Leptodactylus colombiensis</i>				180-2600						X		
<i>Leptodactylus fuscus</i>				0-1500				X		X	X	X
<i>Leptodactylus labialis</i>				0-1000								X
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>				0-900	X	X	X	X		X		X
<i>Physalaemus pustulosus</i>	Rana tangara			50-1400						X	X	X
<i>Pleurodema brachyops</i>				70-200							X	X
<i>Pseudopaludicola pusilla</i>				50-400								X
Familia Microhylidae												
<i>Chiasmocleis panamensis</i>				30-350								X
<i>Nelsonophryne aterrima</i>				300-1600		X				X		
<i>Relictivomer pearsei</i>				0-500								X
Familia Ranidae												
<i>Rana catesbeiana</i>	Rana toro			400-1700		X		X				
<i>Rana vaillanti</i>				0-1700						X	X	X
ORDEN CAUDATA												
Familia Plethodontidae												
<i>Bolitoglossa phalarosoma</i>				1538					X			
<i>Bolitoglossa ramosi</i>			REST	1930					X		X	
<i>Bolitoglossa valleculea</i>			NAL	1990-3100			X	X		X		
<i>Oedipina parvipes</i>				100-1000							X	
ORDEN GYMNO-PHIONA												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	Territorial							
					CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Familia Caeciliidae												
<i>Caecilia antioquiaensis</i>			LOC	1100								X
<i>Caecilia pachynema</i>				1500-1700				X	X	X		
<i>Oscacaecilia polizona</i>			NAL	0-500							X	
<i>Parvacaecilia nicefori</i>			NAL	225-400								X
<i>Epicronops parkeri</i>			REST	1000					X		X	
Familia Typhlonectidae												
<i>Typhlonectes natans</i>				100-400		X		X			X	X

ANEXO 6

Listado Oficial de Reptiles Presentes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA

A continuación se presenta el listado oficial de los Reptiles presentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Con el fin de universalizar la información presentada se definieron los siguientes campos:

° **Taxón:**

Se refiere al Orden, familia, genero y especie.

° **Nombre vernáculo:**

Nombre común dado a la especie, para muchos de ellos no se encontró información.

° **Categoría de Amenaza Nacional:**

Parámetro tomado de los libros rojos publicados por el Instituto Alexander von Humboldt.

° **Endemismo:**

Se refiere al nivel de restricción en su distribución Nal: De orden nacional, REST: Restringida y LOC: local.

° **Distribución Altitudinal:**

Rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar) en que normalmente y de manera natural se encuentra la especie.

° **Territoriales:**

Se refiere a las jurisdicciones de las Direcciones Territoriales en que esta administrativamente dividida CORANTIOQUIA y en cuyo territorio se verificó la presencia de la especie: CI: Citara; CA: Cartama; HE: Hevéxicos; AS: Aburrá Sur; AN: Aburrá Norte; TA: Tahamíes; ZE: Zenufaná; PA: Panzenú.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
ORDEN CROCODYLIA												
Familia Alligatoridae												
<i>Caiman crocodylus</i>	Babilla, caiman comun	LC		0-800							X	X
<i>Crocodylus acutus</i>	Caiman aguja, cocodrilo del magdalena	CR		0-200								
ORDEN SAURIA												
Familia Amphisbaenidae												
<i>Amphisbaena fuliginosa</i>				1000						X	X	
Familia Gekkonidae												
<i>Gonatodes albogularis</i>				50-550	X		X	X		X	X	X
<i>Hemidactylus brookii</i>	Salamanqueja			150-1000							X	X
<i>Lepidoblepharis duolepis</i>			NAL	1000							X	
<i>Lepidoblepharis sanctamartae</i>				50								X
<i>Lepidoblepharis xanthostigma</i>				0-1360							X	X
<i>Sphaerodactylus lineolatus</i>				150								X
<i>Thecadactylus rapicauda</i>	Salamanqueja			150-467							X	X
Familia Gymnophthalmidae												
<i>Echinosauria horrida</i>				1100							X	
<i>Gymnophthalmus speciosus</i>				50-100								X
<i>Leposoma rugiceps</i>				50-400						X		X
<i>Cercosaura argulus</i>				1000-1850					X	X	X	
<i>Cercosaura vertebralis</i>				1300-3000				X	X	X	X	
<i>Proctoporus striatus</i>			NAL	1800-3200				X		X		
<i>Ptychoglossus danieli</i>			REST	50-1000							X	X
<i>Tetrioscincus bifasciatus</i>				400						X		
Familia Iguanidae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Subfamilia												
Corytophaninae												
<i>Basiliscus basiliscus</i>				100-650				X		X		X
<i>Basiliscus galeritus</i>				220-1000	X					X	X	X
<i>Corytophanes cristatus</i>				300-1000						X	X	
Subfamilia Hoplocercinae												
<i>Eryalioides heterolepis</i>				820-2680						X		X
Subfamilia Iguaninae												
<i>Iguana iguana</i>	Iguana			0-1500		X	X	X	X	X	X	X
Subfamilia Polychrotinae												
<i>Anolis antioquiiae</i>	Lagartijo		REST	1680	X					X		
<i>Anolis antonii</i>	Lagartijo			300-1000						X	X	X
<i>Anolis auratus</i>	Lagartijo			50-675	X		X				X	X
<i>Anolis danieli</i>	Lagartijo		REST	1450						X		
<i>Anolis eulaemus</i>	Lagartijo			1450						X		
<i>Anolis gracilipes</i>	Lagartijo			300-400						X	X	
<i>Anolis jericoensis</i>	Lagartijo		LOC	2500		X						
<i>Anolis latifrons</i>	Lagartijo			300-400						X		
<i>Anolis macrolepis</i>	Lagartijo		NAL	50-100								X
<i>Anolis maculigula</i>	Lagartijo		REST	600								X
<i>Anolis maculiventris</i>	Lagartijo			350-1000						X	X	
<i>Anolis mariarum</i>	Lagartijo		REST	1800-2675				X	X	X		
<i>Anolis poecilopus</i>	Lagartijo			100-650								X
<i>Anolis purpurescens</i>	Lagartijo			350-1000						X	X	
<i>Anolis sulcifrons</i>	Lagartijo			300-720						X	X	
<i>Anolis tropidogaster</i>	Lagartijo			50-220								X
<i>Anolis vicarius</i>	Lagartijo			0-400								X
<i>Anolis vittigerus</i>	Lagartijo			50-1100						X	X	X
<i>Phenacosaurus heterodermus</i>	Lagartijo			2300-2600					X	X		
<i>Polychrus marmoratus</i>	Lagartijo			100-1800							X	
Familia Scincidae												
<i>Mabuya mabouya</i>	Lagartijo			0-1400						X		X
Familia Teiidae												

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Ameiva ameiva</i>	Lobito			100-170			X			X	X	X
<i>Ameiva festiva</i>	Lobito			100-935								
<i>Cnemidophorus lemniscatus</i>	Lobito			100-650						X	X	X
<i>Tupinambis teguixin</i>	Lobo pollero			100-650						X		X
ORDEN SERPENTES												
Familia Boidae												
<i>Boa constrictor</i>	Boa			300-400						X	X	
<i>Corallus annulatus</i>	Boa			610						X		
Familia Colubridae												
<i>Atractus andinus</i>	Ciega, marranera		LOC	1537	X							
<i>Atractus lasallei</i>	Ciega, marranera			2550		X				X		
<i>Atractus loveridgei</i>	Ciega, marranera		NAL	2550		X						
<i>Atractus maculatus</i>	Ciega, marranera			1967		X						
<i>Atractus melas</i>	Ciega, marranera		REST	2640						X		
<i>Atractus nicefori</i>	Ciega, marranera		NAL	1569		X		X				
<i>Atractus nigriventris</i>	Ciega, marranera		NAL	1500				X				
<i>Atractus obtusirostris</i>	Ciega, marranera		NAL	50								X
<i>Atractus oculotemporalis</i>	Ciega, marranera		LOC	1967		X						
<i>Atractus sanguineus</i>	Ciega, marranera		LOC	2300						X		
<i>Chironius carinatus</i>	Amarilla, lomo machete			100-1750			X	X		X		X
<i>Chironius grandis-cuamis</i>	Fueteadota, lomo machete, mataballos			300-1000						X	X	
<i>Chironius monticola</i>	Fueteadota, lomo machete, mataballos			2000-2500	X	X	X	X		X		
<i>Clelia clelia</i>	Cazadora negra, candelilla negra			300-400					X	X	X	
<i>Dendrophidion bivittatus</i>	Guardacaminos			300-2800			X			X	X	
<i>Dendrophidion percarinatum</i>	Cazadora			1000						X		
<i>Diaphorolepis laevis</i>			NAL	1750						X		
<i>Dipsas pratti</i>	Culebra		NAL	1800				X	X			
<i>Dipsas sanctioannis</i>	Culebra		NAL	2040-2500		X				X		
<i>Drymarchor corais</i>	Culebra			2500		X						

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa coral			2300						X		
<i>Erythrolamprus bizona</i>	Falsa coral			300-980					X	X	X	
<i>Helicops danieli</i>	Mapana de agua		NAL	125-1583					X		X	
<i>Imantodes cenchoa</i>	Bejuquillo cafetera, higuera			300-1100						X	X	
<i>Leptodeira annulata</i>	platanera			1967		X						
<i>Leptodeira septentrionalis</i>	Bejuquilla, platanera,			100-2300						X	X	X
<i>Leptophis ahaetulla</i>	Bejuca, cazadora			100-650						X	X	X
<i>Liophis epinephelus</i>	Guardacaminos			1750-2800	X		X	X	X	X		
<i>Liophis lineatus</i>	Guardacaminos			100-650							X	X
<i>Liophis melanotus</i>	Guardacaminos			100-1538					X			X
<i>Mastigodryas boddaerti</i>	Cazadora			950-2560		X			X	X	X	
<i>Mastigodryas danieli</i>	Cazadora		REST	0-2560					X	X		
<i>Ninia atrata</i>	Corralito, tierrero			100-700						X	X	X
<i>Oxybelis aeneus</i>	Bejuquillo			720		X						
<i>Oxyrhopus petola</i>	Falsa coral			0-2750		X				X	X	
<i>Pliocercus euryzonus</i>	Falsa coral			2500		X						
<i>Pseudoboa newwedii</i>	Candelilla roja			100-650		X						X
<i>Pseustes poecilonotus</i>	Culebra			100-650								X
<i>Pseustes shroepshirei</i>	Granadilla			300-950						X	X	
<i>Rhadinea decorata</i>	Culebra			700								X
<i>Rhadinea lasteristriga</i>	Falsa mapana			0-2000	X	X						
<i>Sibon nebulata</i>	Toche tigre			780-2000						X	X	
<i>Spilotes pullatus</i>	Toche voladora			300-1100						X	X	
<i>Tantilla alticola</i>	Guardacaminos			550			X					
<i>Tantilla melanocephala</i>	Guardacaminos			1100		X					X	
<i>Xenodon rabdocephalus</i>	Sapa, falsa equis			0-1700		X					X	
Familia Elapidae												
<i>Micrurus dumerilli</i>	Verdadera coral		NAL	400-740							X	X
<i>Micrurus mipartitus</i>	Coral rabo de aji, rabo de candela, gargantilla, Mazagatos			300-2500		X	X	X		X	X	

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.

Taxón	Nombre vernáculo	Categoría Amenaza Nacional	Endemismo	Distribución Altitudinal	CI	CA	HE	AS	AN	TA	ZE	PA
Familia Viperidae												
<i>Bothriechis schlegelii</i>	Vibora, mapana de tierra fría,, vibora de pestaña, guacamayo, granadilla			2500-2640		X				X		
<i>Bothrops asper</i>	Mapana x, venticuatro, pudridora			300-950						X	X	X
<i>Bothriopsis punctata</i>	Rabiseca			300-2300						X	X	
<i>Lachesis muta</i>	Verrugoso			300-400		X				X	X	
<i>Porthidium lansbergii</i>	Patoquilla			0-1800								X
<i>Porthidium nasutum</i>	Patoco			100-1538					X	X		X
ORDEN TESTUDINATA				100-3900								
Familia Chelydridae												
<i>Chelydra serpentina</i>	Guáchara			100-3900		X						
Familia Kinosternidae												
<i>Kinosternon scorpioides</i>	Tapaculo, tortuga de caja	VU		300-920						X	X	
Familia Emydidae												
<i>Rhinoclemmys melenosterna</i>	Palmera	VU		0-200							X	X
<i>Trachemys scripta callirostris</i>	Icotea	VU									X	X
Familia Testudinidae												
<i>Geochelone carbonaria</i>	Morrocay	CR		0-600						X	X	X

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A.R. 2000. Ranas, salamandras y caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia. *Biota Colombiana* 1: 289-319.

Birdlife International. 2000. *Threatened birds of the world*. Barcelona y Cambridge: Lynx Edicions y BirdLife International.

Chaves, M.E. & M. Arango (Eds). 1997. *Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad* 3 vol. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá-Colombia.

CORANTIOQUIA. 2007. *Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2007-2019*. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Medellín. 337 p.

Cuartas-Calle, C. A. 2005. *Mamíferos no voladores reportados en el área jurisdicción de CORANTIOQUIA*. Informe final.

Cuervo, A. M., J. M. Ochoa, C. Delgado & J. A. Palacio. 1999. *Evaluación de la avifauna y de la mastofauna del proyecto de reserva regional La Forzosa, Municipio de Anorí, Departamento de Antioquia*. Informe Final. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA.

Cuervo, A. M. & Salaman, P. G. W. 1999. Natural History of the Blue-Billed Curassow (*Crax alberti*). *Bulletin Cracid Specialist Group*. 8: 3-10.

Cuervo, A. M. & C. A. Delgado. 2001. Adiciones a la avifauna del Valle de Aburrá y comentarios sobre la investigación ornitológica local. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* SAO 12 (22-23): 52-65.

Cuervo, A. M., P. G. W. Salaman, T. M. Donegan & J. M. Ochoa. 2001. A new species of piha (Cotingidae: Lipaugus) from the Cordillera Central of Colombia. *Ibis* 143: 353-368

Cuervo, A. M., C. D. Cadena, N. Krabbe & L. M. Renjifo. 2005. *Scytalopus stilesi*, a new species of tapaculo (Rhinocryptidae) from the Cordillera Central of Colombia. *Auk* 122: 445-463.

Cuervo, A. M., 2006. Compendio de la Aves Reportadas en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA., Contrato 6840.52p.

Emmons H. L., y F. Feer. 1999. Mamíferos de los bosques húmedos de América tropical. Una guía de campo. Primera edición en castellano. The University of Chicago Press. Chicago and London, 307 pp.

Galeano, S. P. 2004. Anfibios y reptiles reportados en el área de jurisdicción de la corporación autónoma regional del centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato 5586.334p.

Hernández. 2003. Estrategia eco-regional para la conservación del oso andino en los Andes del norte. WWF Colombia, Fundación WII, EcoCiencia & Wildlife Conservation Society. Cali, Colombia

Hilty, S. L. & W. Brown W.L. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, NJ. traducida por Alvarez -lopez 2001.1030p.

Hurtado Hernández J, Estado del conocimiento de la fauna silvestre en la jurisdicción de Corantioquia, ORDEN DE SERVICIO No. 4114 de 2007. 26p

IUCN, 1994. Eurasian Insectivores and Tree Shrews - Status Survey and Conservation Action Plan. (Compiled by Stone, R. David, IUCN/SSC Insectivore, Tree Shrew and Elephant Shrew Specialist Group). IUCN, Gland, Switzerland, 164 pp.

IUCN 2003. Directrices para emplear los criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel nacional y regional, Versión 3.0., preparadas por la Comisión de supervivencia de Especies de la UICN. IUCN-Unión Mundial para la Naturaleza. Gland, Suiza. En: <http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/regionalguidelines.htm>.

Muñoz, J., C. A. Cuartas-Calle, y González M. 2004. Murciélagos del área de Jurisdicción de CORANTIOQUIA, contrato 4751.405 p.

Pérez-S. & Moreno. 1988. Ofidios de Colombia. Mus. reg. Sci. nat. Torino Monografía VI, Torino. 517 p.

Peyton, B. 1980. Ecology, distribution, and food habits of spectacled bears, *Tremarctos ornatus*, in Peru. Journal of Mammalogy 61:639-652.

Pulgarín, W. A. Múnera, F. G. Stiles, & P. Salaman. 2005. Rediscovery of the Dusky Star-frontlet *Coeligena orina*, with a description of the adult plumages and a reassessment of its taxonomic status. Ornitología Colombiana 3: 28-35.

Remsen, J. V., JR., A. Jaramillo, M. A. Nores, J. Pacheco, M. B. Robbins, T. S. Schulenberg, F. G. Stiles, J. M. C. Silva, D. F. Stotz, & K. J. Zimmer [online]. 2006. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~remsen/SACCBaseline.html>. (Versión agosto de 2006).

Renjifo, L. M., G. P. Servat, J. M. Goerck, B. A. Loiselle & J. G. Blake. 1997. Patterns of species composition and endemism in the northern neotropics: a case for conservation of montane avifaunas. *Ornithological Monographs* 48: 577-594.

Renjifo, L. M., Franco, A. M., Amaya, J. D., Kattan, G. H. & Lanus, B. 2002. Libro Rojo de Aves de Colombia. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, D.C., Colombia. 562 p.

Rodriguez-Mahecha, J. V. & Hernández-Camacho, J. I. 2002. Loros de Colombia. Conservación Internacional, Bogotá, D.C., Colombia. 478 p.

Rodríguez, J. V. 1998. Listas preliminares de mamíferos colombianos con algún riesgo a la extinción. Informe final presentado al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Rodríguez, J., J. Hernández-Camacho, T. R. Defler, M. Alberico, R. B. Mast, R. A. Mittermeier y A. Cadena. 1995. Mamíferos colombianos, sus nombres comunes e indígenas. *Occasional Papers in Conservation Biology*. Occasional Paper, 3: 1-56pp.

Serna, M. A. 1980. Catálogo de aves del Museo de Historia Natural, Colegio San José. Colegio San José de la Salle, Medellín.

Stiles, F. G. 1998. Las aves endémicas de Colombia. Pp.378-385,428-432. En: M. E. Chaves & N. Arango (eds.). Informe nacional sobre el estado de la diversidad 1997, Colombia. Tomo 1, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Santafé de Bogotá.

Toro, J. L. & A. M. Cuervo. 2001. Aves en peligro de extinción en Antioquia. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. Medellín, 96 pp. ISBN 9589663966.

Wilson, D. E and D. A. Reeder. 1992. *Mammals species of the world: A taxonomic and geographic references*, 2° ed. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C, 1-1206 pp.

Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia.



Estado del Conocimiento de la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia

